

Bipacksedel

Neurol forte dragerade tabletter

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Neurol forte?

1 tablett innehåller:

Verksamt ämne: Valeriana officinalis L. (vänderot), rot, torrt vattenextrakt (2,1-4,2:1) 260 mg motsvarande 820 mg valerianarot.

Övriga ämnen: laktosmonohydrat 70 mg, sackaros, torkad glukossirap, talk, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, magnesiumstearat, akaciagummi, riboflavin, etylcellulosa, makrogol titandioxid och chlorofyllin (E 141).

Hur verkar Neurol forte?

Neurol forte är ett växtbaserat läkemedel som innehåller rotextrakt från vänderot (*Valeriana officinalis L.*). Neurol forte har mildt rogivande effekt.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av:

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-748 49 50

Vad används Neurol forte för?

Växtbaserat läkemedel vid tillfällig lindrig oro och vid tillfälliga insomningsbesvär.

När skall Neurol forte inte användas

Neurol forte skall inte användas om du är överkänslig (allergisk) mot valeriana eller något av övriga innehållsämnen i Neurol forte.

Att tänka på innan och när Neurol forte används

Var särskilt försiktig med Neurol forte om du har eller tidigare har haft kraftigt nedsatt leverfunktion eller svår njursjukdom, då effekten av Neurol forte inte har studerats på dessa sjukdomar.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Neurol forte.

Graviditet

Bör inte användas av gravida kvinnor.

Amning

Bör inte användas av ammande kvinnor.

Trafikvarning

Ta inte Neurol forte omedelbart (upp till två timmar) innan du skall köra bil eller använda maskiner, eftersom Neurol forte har en mildt rogivande effekt. Du är själv ansvarig för att

bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

Vad skall du undvika när du använder Neurol forte

Neurol forte kan förstärka effekten av alkohol och läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t ex sömnmedel, ångstdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel. Neurol forte skall därför användas med försiktighet ihop med alkohol och sådana läkemedel.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år:

Tillfällig lindrig oro: 1 tablett 3-4 gånger dagligen vid behov.

Tillfälliga insomningsbesvär: 1-2 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-3 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 1-2 tabletter en halvtimme före sänggåendet.

Maximalt 5 tabletter per dygn.

Neurol Forte bör inte ges till barn under 12 år.

Kontakta läkare om symtomen varar i mer än två veckor eller om de förvärras.

Överdoser

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Biverkningar

Inga kända biverkningar vid rekommenderad användning.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller farmaceut.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst +25°C. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Datum för senaste revidering av bipacksedeln

2006-07-03