

BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Demp, tuggtablett

2 VAD INNEHÅLLER DEMP?

1 tuggtablett innehåller:

Aktiva innehållsämnen:

Magnesiumhydroxid	250 mg
Kalciumkarbonat	150 mg
Magnesiumkarbonat	100 mg

Övriga innehållsämnen:

Mannitol, gelatin, magnesiumstearat,
karmellosnatrium, pepparmyntarom

3 HUR VERKAR DEMP?

Syraneutraliserande. Effekten inträder inom några minuter och kvarstår upp till 30 minuter.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV

Pharbio Medical International AB
Box 30060
400 43 Göteborg

Ombud:

Cederroth International AB
Box 715
194 27 Upplands Väsby
Tel: 08-590 963 00
info@cederroth.com

5 VAD ANVÄNDS DEMP FÖR?

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.

6 NÄR SKA DEMP INTE ANVÄNDAS?

Vid för högt kalkvärde i blodet (hyperkalcemi).

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR DEMP ANVÄNDS:

De som har nedsatt njurfunktion bör inte använda Demp utan att först rådgöra med läkare.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

GRAVIDITET

Inga kända risker vid användning under graviditet.

AMNING

Inga kända risker vid användning under amning.

TRAFIKVARNING

Inga kända risker.

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER DEMP?

Intag av Demp kan påverka effekten av vissa andra mediciner om de tas samtidigt. Intag av Demp kan minska upptaget av andra mediciner som järnpreparat, tetracykliner, ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, penicillamin och estramustin. Vidare kan Demp minska upplösningen av ketokonazoltabletter och minska effekten av gabapentintabletter till följd av pH-förändring i magsäcken. Därför bör samtidigt intag av Demp och dessa läkemedel ej ske. Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel och föda är inte studerad. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra mediciner.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA DEMP?

Vuxna och barn över 12 år:

1–2 tuggtabletter vid behov, dock högst 12 tuggtabletter dagligen. Tabletterna bör tuggas väl.

Användningen begränsas till 2 veckor.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid Giftinformationscentralen, läkare eller sjukhus på telefon 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN DEMP GE?

Kontinuerlig användning av stora doser Demp kan leda till förstoppning och diarré.

9 HUR SKA DEMP FÖRVARAS?

Förvaras torrt vid högst 25°C, i väl tillsluten förpackning.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR DEMP?

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2006-10-20