

## **BIPACKSEDEL**

### **1 LÄKEMEDELTS NAMN, LÄKEMEDELFORM OCH STYRKA**

Hypermin, tabletter.

### **2 VAD INNEHÅLLER HYPERMIN?**

1 tablett innehåller: Johannesört (Hypericum perforatum L.) Herbaextrakt 40-73 mg.  
Mikrokristallin cellulosa. Majsstärkelse. Polysackarid från soja (Emcosoy®). Bomullsfröolja, hydrogenerad.

För tillverkning av en tablett åtgår ca 0,7-1,3 g färsk johannesört motsvarande 0,16-0,33 g torkad ört.

### **3 HUR VERKAR HYPERMIN ?**

Milt stämningshöjande, rogivande.

### **4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND**

Svenska Bioforce AB  
Box 147  
221 00 Lund  
Tel: 046-23 47 00

### **5 VAD ANVÄNDS HYPERMIN FÖR?**

Traditionellt använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

### **6 NÄR SKA HYPERMIN INTE ANVÄNDAS?**

Dokumentation för ställningstagande till detta saknas.

#### **ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR HYPERMIN ANVÄNDS:**

Kontakt med läkare bör ske om försämring av symptom skulle inträffa efter att behandlingen påbörjats.

#### **GRAVIDITET OCH AMNING**

Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.

#### **TRAFIKVARNING**

Naturläkemedlet kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

#### **VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER HYPERMIN?**

Hypermin ska ej användas under samma tidsperiod som du använder andra läkemedel inklusive p-piller, p-injektion och p-stav. Orsaken är att Hypermin kan minska blodkoncentrationen och därmed effekten av andra läkemedel vid samtidig användning samt upp till ca två veckor efter att du avslutat behandling med Hypermin. Biverkningsrisken kan desutom öka om du kombinerar Hypermin med vissa antidepressiva läkemedel (serotoninåterupptagshämmare, nefazodon) och medel mot migrän (triptaner). Om du redan

tar Hypermin samtidigt som du använder andra läkemedel bör du kontakta förskrivare innan du avslutar behandlingen med Hypermin. Dosen av andra läkemedel kan behöva minskas när du slutar behandling med Hypermin eller byter till annan johannesört produkt.

**7 HUR SKALL DU ANVÄNDA HYPERMIN?**

Vuxna och barn över 12 år:  
1 tablett 3 gånger dagligen.  
Rekommenderas ej till barn under 12 år.

**VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?/VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?**

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

**8 VILKA BIVERKNINGAR KAN HYPERMIN GE?**

Lättare magbesvär, allergiska reaktioner. I sällsynta fall är det möjligt med ljuskänslighet, främst hos ljushyade personer och vid överdosering. Kontakta läkare om du misstänker att Hypermin gett dig allvarliga biverkningar.

**9 HUR SKA HYPERMIN FÖRVARAS?**

Förvaras i rumstemperatur.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

**10 VILKEN HÅLLBARHET HAR HYPERMIN?**

Används före utgångsdatum som finns på etikett och kapsel.

**11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN**

2002-08-15