

## BIPACKSEDEL

### 1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELFORM OCH STYRKA

Memazoc, oral lösning

### 2 VAD INNEHÅLLER MEMAZOC?

100 ml innehåller:

Ginkgo Biloba L., blad, extrakt 516 mg ( innehåller minimum 124 mg ginkgoflavonglykosider och 31 mg terpenlaktoner).

Invertsockersirap (79 g invertsocker) propylenglykol, etanol (6,5 g), lakritsarom, konserveringsmedel E 218, E214 och E 216.

Vid tillverkning av 15 ml oral lösning åtgår ca 4 g blad av Ginkgo biloba.

### 3 HUR VERKAR MEMAZOC

Memazoc befrämjar blodcirkulationen.

### 4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Birger Ledin AB  
Norra Vägen 12  
542 33 Mariestad  
Tel. 0501-195 55

### 5 VAD ANVÄNDS MEMAZOC FÖR?

Naturläkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor, såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusning och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger.

### 6 NÄR SKA MEMAZOC INTE ANVÄNDAS?

-

#### ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR MEMAZOC ANVÄNDS:

Personer som regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t e x antikoagulantia och acetylsalicylsyra) bör rådgöra med sin läkare före användning av Memazoc.

P g a ökad risk för blödning bör man inte använda Memazoc under veckorna före planerad operation.

Memazoc innehåller invertsocker. Om du inte tål vissa sockerarter bör du därför kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

#### GRAVIDITET

Användning under graviditet kan inte rekommenderas

#### **AMNING**

Användning under amning kan inte rekommenderas

#### **TRAFIKVARNING**

Inga kända risker.

#### **VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER MEMAZOC?**

Förstärkning av effekten av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (antikoagulantia) kan inte uteslutas. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.

#### **7 HUR SKALL DU ANVÄNDA MEMAZOC?**

1-1 1/2 msk dagligen i samband med måltiderna. Rekommenderas ej till barn.

#### **VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?**

Om du fått i Dig för stor mängd av preparatet, kontakta alltid Giftinformationscentralen (Tel: 112), läkare eller sjukhus för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **8 VILKA BIVERKNINGAR KAN MEMAZOC GE?**

Memazoc tolereras väl. Biverkningarna är mycket sällsynta och av lindrig art, som t ex. huvudvärk eller hudirritation. Kontakta läkare om du misstänker att Memazoc gett dig allvarliga biverkningar.

#### **9 HUR SKA MEMAZOC FÖRVARAS?**

Memazoc förvaras i rumstemperatur. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

#### **10 VILKEN HÅLLBARHET HAR MEMAZOC?**

Används före utgångsdatum, som finns på förpackningen.

#### **11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN**

2007-08-21