

BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Neurokan, filmdragerade tabletter.

2 VAD INNEHÅLLER NEUROKAN?

1 tablett innehåller:

Torrt extrakt av johannesört (*Hypericum perforatum* L.) ört 300 mg.

Vid tillverkning av 1 tablett åtgår 900-2100 mg johannesört.

Övriga innehållsämnen:

Ascorbinsyra, mikrokristallinsk cellulosa, modifierad majsstärkelse, natriumkarboximetylcellulosa, kiseldioxid, magnesiumstearat, hydroxietylpropylmetylcellulosa, Macrogol, laktosmonohydrat, vanillin, natriumsackarinat, talk, dimetylpolysiloxan (kiselaktiverat), metylcellulosa, sorbinsyra, färgämnen (E171, E172).

3 HUR VERKAR NEUROKAN?

Milt stämningshöjande, rogivande och sömngivande.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse 4
D-76227 Karlsruhe
Tyskland

Ombud:
MaxMedica AB
BOX 505 77
202 15 Malmö
Tel: 040-660 20 40
Info@maxmedica.se

5 VAD ANVÄNDS NEUROKAN FÖR?

Traditionellt använt vid lätt nedstämdhet, vid lindrig oro och mot tillfälliga insomningsbesvär.

6 NÄR SKA NEUROKAN INTE ANVÄNDAS?

Ska ej användas under samma tidsperiod som behandling med andra läkemedel.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR NEUROKAN ANVÄNDS:

Kontakt med läkare bör ske om försämring av symtom skulle inträffa efter att behandlingen påbörjats.

GRAVIDITET OCH AMNING

Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.

TRAFIKVARNING

Neurokan kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER NEUROKAN?

Neurokan ska ej användas under samma tidsperiod som du använder andra läkemedel inklusive p-piller, p-injektion och p-stav. Orsaken är att Neurokan kan minska blodkoncentrationen och därmed effekten av andra läkemedel vid samtidig användning samt upp till ca. två veckor efter att du avslutat behandling med Neurokan. Biverkningsrisken kan dessutom öka om du kombinerar Neurokan med vissa antidepressiva läkemedel (serotoninåterupptagshämmare, nefazodon) och medel mot migrän (triptaner).

Om du redan tar Neurokan samtidigt som du använder andra läkemedel bör du kontakta förskrivare innan du avslutar behandlingen med Neurokan. Dosen av andra läkemedel kan behöva minskas när du slutar behandling med Neurokan eller byter till annan johannesörtprodukt.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA NEUROKAN?

Vuxna och barn över 12 år:

1 tablett 2 gånger dagligen. Sväljes hel med lite vatten i samband med måltid. Rekommenderas ej till barn under 12 år.

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN NEUROKAN GE?

I sällsynta fall kan lättare magbesvär och allergiska hudreaktioner förekomma. I sällsynta fall är det möjligt med ljuskänslighet, främst hos ljushyade personer samt vid överdosering. Kontakta läkare om Du misstänker att Neurokan gett Dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA NEUROKAN FÖRVARAS?

Förvaras i rumstemperatur.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR NEUROKAN?

Användes före utgångsdatum som finns på kartongen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2009-04-01