

BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Prostakan, kapslar.

2 VAD INNEHÅLLER PROSTAKAN?

1 kapsel innehåller:

Extrakt av sågpalmtofrukt (*Serenoa repens (Bartram) Small*) 160 mg.

Extrakt av brännässelrot (*Urtica dioica L. / Urtica urens L.*) 120 mg.

Vid tillverkning av 1 kapsel åtgår 1,6-2,3 g frukt av sågpalmetto och 1-1,5 g brännässelrot.

Övriga innehållsämnen:

Gelatin succinylbehandlad, glycerol 85%, hårdfett, kiseldioxid; kolloidal; vattenfri, sojaolja; hydrerad, färgämne: patentblått V (E131), järnoxider och järnhydroxider (E172).

3 HUR VERKAR PROSTAKAN?

Lindrar vattenkastningsbesvär vid godartad prostataförstoring.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str.4

D-76227 Karlsruhe

Tyskland

Ombud:

Pharma Hus AB

Box 8134

163 08 Spånga

Tel: 08-36 30 00

5 VAD ANVÄNDS PROSTAKAN FÖR?

Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

6 NÄR SKA PROSTAKAN INTE ANVÄNDAS?

Prostakan innehåller sojaolja. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller soja.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR PROSTAKAN ANVÄNDS:

Kontakta läkare innan behandling för att inte missa bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- och urinblåsecancer).

Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader.

Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten såsom antikoagulantia (t ex Waran) bör du rådgöra med din läkare innan du använder Prostakan.

GRAVIDITET OCH AMNING

-

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER PROSTAKAN?

Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel eller föda är inte studerad.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA PROSTAKAN?

Vuxna:

1 kapsel 2 gånger dagligen. Sväljes hela med lite vatten.

Rekommenderas ej till barn.

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN PROSTAKAN GE?

I sällsynta fall kan mag-tarmbesvär förekomma. Kontakta läkare om du misstänker att Prostakan gett dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA PROSTAKAN FÖRVARAS?

Förvaras i rumstemperatur.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR PROSTAKAN?

Användes före utgångsdatum som finns på kartongen.

11 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Prostata (blåshalskörteln) ligger strax under urinblåsan hos män och omsluter urinrörets övre del. Dess tillväxt styrs av det manliga könshormonet testosteron och de hormonella förändringar som sker med ökad ålder anses vara anledningen till att storleken av prostata ökar med åren. Detta kallas för godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi). I 50-årsåldern är prostata förstörd hos de flesta män men alla får inte besvär av detta. Hos vissa pressar dock den förstörde körteln samman urinröret på ett sätt som leder till problem vid vattenkastningen. Dessa besvär kan uttrycka sig som täta trängningar och svårigheter att tömma blåsan helt.

Vissa andra, mer allvarliga sjukdomar, t.ex. prostata- eller urinblåsecancer kan ge liknande symtom som vid godartad prostataförstoring. Därför är det viktigt att du besöker läkare innan du börjar din behandling med Prostakankapslar. Kontakta även läkare om dina besvär skulle förvärras eller om nya symtom skulle tillstå.

12 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2009-07-03

