

BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Sabamin, kapsel mjuk

2 VAD INNEHÅLLER SABAMIN?

1 kapsel innehåller: *Serenoa repens* (Bartr.) Small (sågpalmetto) frukt, extrakt (9-12:1), 320 mg. Kapselhjälpmedel; gelatin, glycerol, sorbitol (70%), vatten, järnoxider, röd, svart, gul (E172)

Vid tillverkning av 1 kapsel åtgår 2,88-3,84 g torkad sågpalmettofrukt.

3 HUR VERKAR SABAMIN?

Lindrar vattenkastningsbesvär vid godartad prostataförstoring.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Svenska Bioforce AB
Box 147
221 00 LUND
Tel: 046/23 47 00
info@bioforce.se

5 VAD ANVÄNDS SABAMIN FÖR?

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t ex täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

6 NÄR SKA SABAMIN INTE ANVÄNDAS?

Dokumentation för ställningstagande till detta saknas.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR SABAMIN ANVÄNDS:

De som lider av sällsynta ärftliga besvär av fruktosintolerans bör kontakta sin läkare innan detta läkemedel används.

För att inte förbise eventuellt bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- och urinblåscancer) skall läkare kontaktas innan behandlingen påbörjas.

Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iaktas vid behandling.

Om du regelbundet använder blodförtunnande läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t ex Waran) bör du rådgöra med din läkare innan du använder Sabamin.

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER SABAMIN?

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerad.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA SABAMIN?

Vuxna:

1 kapsel dagligen. Kapseln sväljes med vätska lämpligen i samband med måltid. Rekommenderas ej till barn.

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig för stor mängd av Sabamin kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tfn 112, för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGARKAN SABAMIN GE?

Magtarmsbesvär kan förekomma i sällsynta fall.

9 HUR SKA SABAMIN FÖRVARAS?

Förvaras vid högst 25 °C. Kapslarna förvaras i försluten burk.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR SABAMIN?

Skall användas före utgångsdatum som finns på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2009-07-03