

BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Sanaxeen, filmdragerad tablett

2 VAD INNEHÅLLER SANAXEEN ?

1 tablett innehåller:

Extrakt av pollen (*Secale cereale* L. (råg), *Phleum pratense* L. (timotej) och *Zea mays* L. (majs)), extraktionsmedel: vatten/aceton (95/5) 70 mg

Extrakt av pollen (*Secale cereale* L. (råg), *Phleum pratense* L. (timotej) och *Zea mays* L. (majs)), extraktionsmedel: acetone 4 mg

Övriga innehållsämnen:

Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, spraytorkad akaciagummi, polysorbat 20, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, shellack, magnesiumstearat, talk.

Vid tillverkning av en tablett åtgår ca 95 mg torkat pollen.

3 HUR VERKAR SANAXEEN ?

Lindrar symptomen vid godartad prostataförstoring.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV

Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, 561 51 Huskvarna

5 VAD ANVÄNDS SANAXEEN FÖR?

Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, tex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger.

6 NÄR SKA SANAXEEN INTE ANVÄNDAS?

Dokumentation för ställningstagande till detta saknas.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR SANAXEEN ANVÄNDS:

Kontakta läkare innan behandling för att inte missa bakomliggande allvarlig sjukdom, se även "Särskilda upplysningar".

Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader.

Sanaxeen innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter bör du därför kontakta din läkare innan du tar detta naturläkemedel.

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER SANAXEEN?

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.

7 DOSERINGSANVISNING

Vuxna: Normaldosering: 2-4 tabletter dagligen.
Vid behov kan dosen ökas till 4-6 tabletter dagligen under 3 veckor, därefter normaldosering.
Tabletterna sväljes med vätska. Rekommenderas ej till barn.

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?

Om Du fått i Dig för stor mängd av Sanaxeen, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN SANAXEEN GE?

I sällsynta fall har allergiska reaktioner samt mag-tarmbesvär rapporterats. Kontakta läkare om du misstänker allvarliga biverkningar i samband med användandet av Sanaxeen.

9 HUR SKA SANAXEEN FÖRVARAS?

Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR SANAXEEN?

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

Prostata (blåshalskörteln) ligger strax under urinblåsan hos män och omsluter urinrörets övre del. Dess tillväxt styrs av det manliga könshormonet testosteron och de hormonella förändringar som sker med ökad ålder anses vara anledningen till att storleken av prostata ökar med åren. Detta kallas godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi). I 50-årsåldern är prostata förstörd hos de flesta män men inte alla får besvär av detta. Hos vissa pressar dock den förstörade körteln samman urinröret på ett sätt som leder till problem vid vattenkastningen. Dessa besvär kan uttrycka sig som täta trängningar och svårigheter att tömma blåsan helt.

Vissa andra mera allvarliga sjukdomar, t.ex. prostata- eller urinblåsecancer, kan ge liknande symptom som de vid godartad prostataförstoring. Därför är det viktigt att du besöker läkare innan du börjar din behandling med Sanaxeen. Kontakta även läkare om dina besvär skulle förvärras eller om nya symptom skulle tillstöta.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2006-03-29