

BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Trevis, hårda kapslar (kapslar).

2 VAD INNEHÅLLER TREVIS?

En kapsel innehåller:

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Totalantal 1-10 x 10⁹ bakterier.

Övriga innehållsämnen:

Glukosanhydrat, skummjölkspulver (motsvarande 5-10 mg laktos), jästextrakt, natriumaskorbat, inositol, natriumglutaminat, natriumalginat, magnesiumstearat, dimetikon, gelatin, titandioxid (färgämne E171).

3 HUR VERKAR TREVIS?

De i Trevis ingående mjölksyrabakterierna (lactobaciller) når till viss del fram till tunn- och tjocktarm och anses där påverka tarmfloran genom olika mekanismer. Effekten upphör efter utsättande av preparatet.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel:08-630 19 00

Tillverkare:

Chr. Hansen A/S

10-12 Bøge Allé

DK-2970 Hørsholm

Danmark

5 VAD ANVÄNDS TREVIS FÖR?

Traditionellt använt för normalisering av tarmfloran vid tillfälliga mag/tarmstörningar såsom t.ex. lindrig diarré och förstoppning samt förebyggande och behandling av vanlig okomplicerad turistdiarré.

6 NÄR SKA TREVIS INTE ANVÄNDAS?

Information om detta saknas.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR TREVIS ANVÄNDS:

Du kan ytterligare minska risken för turistdiarré genom att vara försiktig med mat och dryck samt hygien. Var uppmärksam på att diarré kan vara ett tecken på något annat än turistmage. Om Du trots alla säkerhetsåtgärder råkar ut för diarré, tänk på att dricka rikligt med vätska. Om Du dricker vatten så kom ihåg att det skall vara buteljerat mineral- eller dricksvatten eller kokt i några minuter.

VIKTIGT: Tillkalla alltid läkare om:

- diarrén varar i mer än 2 dygn
- avföringen är blodig
- Du har hög feber

Särskilt barn och äldre kan bli allvarligt sjuka av den vätskeförlust en diarré för med sig. Befinner Du dig i ett område med t.ex. tyfus och kolera, bör Du under alla omständigheter söka läkare vid diarré.

GRAVIDITET

Trevis påverkan vid graviditet har ej studerats.

AMNING

Trevis kan användas av ammande kvinnor.

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER TREVIS?

Mjölksyrabakterier är som andra bakterier känsliga för antibiotika, varför Trevis och antibiotika bör tas med minst 3 timmars mellanrum. Ytterligare interaktioner med andra naturläkemedel, läkemedel eller föda kan förekomma men är inte studerat.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA TREVIS?

1 kapsel 3 gånger dagligen tas till måltid. Samma dos till vuxna och barn över 8 år. Då Trevis används för att förebygga vanlig turistdiarré påbörjas behandlingen 2 dagar före avresan och avslutas 2 dagar efter hemkomsten. Rekommenderas ej till barn under 8 år.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN TREVIS GE?

Inga rapporter om biverkningar
Kontakta läkare om du misstänker att Trevis gett dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA TREVIS FÖRVARAS?

Förvaras vid högst 25°C. Under kortare perioder upp till 1 månad kan Trevis förvaras vid maximalt 30°C. Förvaras i rumstemperatur. Under resan skall Trevis skyddas mot stark värme. Låt t.ex. aldrig en förpackning Trevis ligga kvar i en parkerad bil eller i en väska på stranden.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR TREVIS?

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2009-06-30