

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Desivon **Klorhexidindiglukonat** **Lösning för utvärtes bruk 0,5 mg/ml**

Vad innehåller Desivon?

Klorhexidindiglukonat 0,5 mg. aq purif. ad. 1 ml

Hur skall du använda Desivon?

Huddesinfektion och sårrengöring: Tvätta först området kring sårytan med en bomullstuss indränkt med Desivon. Byt därefter till en ny bomullstuss indränkt med Desivon och rengör själva sårytan. Skölj sedan såret med några droppar Desivon.

Hur verkar Desivon?

Antiseptiskt

Vad används Desivon för?

Desinfektion av små sår.

När ska Desivon inte användas?

Vid känd överkänslighet mot klorhexidin. Skall ej användas i öronen.

Att tänka på innan och när Desivon används.

Undvik kontakt med ögonen.

Graviditet

Produkten kan användas under graviditet.

Amning

Produkten kan användas under amning.

Vad skall du undvika när du använder Desivon?

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig Desivon kontakta alltid Giftinformationscentralen (tel. 112), läkare eller sjukhus.

Vilka biverkningar kan Desivon ge?

Hudirritation och i sällsynta fall överkänslighet.

Hur skall Desivon förvaras?

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen, se etikettens framsida.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

MT nr 15814

Innehavare av försäljningstillstånd:

Cederroth AB

Box 715

194 27 Upplands Väsby

Tel: 08-590 963 00

Datum för senaste revidering av bipacksedeln: 2010-01-12