

## BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

### Förhårnadsplåster Scholl 40 % medicinskt plåster Salicylsyra

**Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt. Förhårnadsplåster Scholl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

**I denna bipacksedel finner du information om:**

1. Vad Förhårnadsplåster Scholl är och vad det används för
2. Innan du använder Förhårnadsplåster Scholl
3. Hur du använder Förhårnadsplåster Scholl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Förhårnadsplåster Scholl ska förvaras
6. Övriga upplysningar

### 1. VAD FÖRHÅRDNADSPLÅSTER SCHOLL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Förhårnadsplåster Scholl innehåller salicylsyra. Salicylsyra är ett keratolytiskt medel som betyder att det mjukar upp förhårnad hud.

Förhårnadsplåster Scholl används för att effektivt och smärtfritt avlägsna förhårnader.

### 2. INNAN DU ANVÄNDER FÖRHÅRDNADSPLÅSTER SCHOLL

**Använd inte Förhårnadsplåster Scholl**

- om du är allergisk (överkänslig) mot salicylsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i Förhårnadsplåster Scholl.
- om du är diabetiker eller har problem med blodcirkulationen.
- om huden kring förhårnaden är inflammerad eller sårig.
- på mollusker eller födelsemärken.

**Var särskilt försiktig med Förhårnadsplåster Scholl**

Plåstret får inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon.

Avbryt behandlingen och ta bort plåstret om hudirritation uppstår.

Du ska inte använda plåstret på frisk hud utan plåstret ska endast täcka förhårnaden.

**Användning av andra läkemedel**

Effekt av samtidig användning av andra läkemedel inklusive naturläkemedel har inte studerats.

**Graviditet och amning**

Då erfarenhet är begränsad kan användning av Förhårnadsplåster Scholl inte rekommenderas under graviditet och amning.

### 3. HUR DU ANVÄNDER FÖRHÅRDNADSPLÅSTER SCHOLL

*Vuxna och ungdomar över 16 år:*

- Rengör och torka fötterna noga.
- Skrapa bort lös hud
- Fäst ett förhårdnadsplåster på förhårdnaden och täck med ett skyddande plåstret. Vid behov, klipp till förhårdnadsplåstret så att det bara täcker förhårdnaden och inte kommer i kontakt med frisk hud.
- Upprepa dagligen tills förhårdnaden försvinner, dock inte längre än 2 veckor, om inte läkare rekommenderat annat.

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 16 år utan läkares ordination.

#### **Om du använt för stor mängd av Förhårdnadsplåster Scholl**

Om du använt för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig produkten av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

#### **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Förhårdnadsplåster Scholl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Det är osannolikt att du får biverkningar när du använder produkten rätt. Eventuell hudirritation är möjlig med vanligen inget att oroas sig för. Om du får mycket obehag, irritation eller överkänslighet, avbryt behandlingen.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

#### **5. HUR FÖRHÅRDNADSPLÅSTER SCHOLL SKA FÖRVARAS**

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Öppnad förpackning ska användas inom 6 veckor.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

#### **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

##### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är salicylsyra. Ett förhårdnadsplåster innehåller 40 % salicylsyra, motsvarande 38 mg per plåster.
- Övriga innehållsämnen är polyvinylalkyleter, titandioxid (E171), flytande paraffin, 4,4'-tio-bis-2-tertbutyl-5-metylfenol, röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Varje förpackning innehåller 4 förhårnadsplåster och 4 skyddande plåster eller 8 förhårnadsplåster och 8 skyddande plåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

SSL International plc

1 Old Park Lane

Manchester

M41 7HA

Storbritannien

**Ombud**

SSL Healthcare Sverige AB

Box 1326

171 26 Solna

**Denna bipacksedel godkändes senast: 2009-05-25**