

## BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION

### Lacryvisc 3 mg/g ögongel, endosbehållare

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens rekommendationer samt anvisningarna på etiketten, som påklitrats läkemedels-förpackningen i apoteket.

**1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA**

Lacryvisc 3 mg/g ögongel, endosbehållare

**2 VAD INNEHÅLLER LACRYVISC**

*1 gram innehåller:* Karbomer 3,0 mg, sorbitol, natriumhydroxid (för att justera surhetsgraden) och renat vatten.

**3 HUR VERKAR LACRYVISC**

Lacryvisc är en konstgjord tårvätska som hjälper den naturliga tårfilmen och smörjer obehagliga torra punkter i ögat.

**4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV**

Innehavare av försäljningstillstånd: Laboratoires Alcon S.A., 23 Rue Georges Ferrenbach, F-68240 Kaysersberg, Frankrike

Information lämnas av: Alcon Sverige AB, Box 12233, 102 26 Stockholm,  
Tel.: 08-634 40 00

**5 VAD ANVÄNDS LACRYVISC FÖR?**

Behandling av ögonen i samband med lättare ögonirritation eller torra ögon.

**6 NÄR SKA LACRYVISC INTE ANVÄNDAS?**

Vid överkänslighet för någon av de ingående beståndsdelarna.

**ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR LACRYVISC ANVÄNDS:**

Om smärta i ögat, synrubbingar, kvarstående rodnad i ögat eller ögonirritation uppträder eller om ögat inte förbättras inom tre dygn bör läkare kontaktas.

Eftersom ögongelen ibland kan ge irritation i ögonen bör man inte själv öka dosen utan att först ha tagit kontakt med läkare.

Om gelen ändrar färg eller blir grumlig skall den inte längre användas.

**GRAVIDITET OCH AMNING**

Inga kända risker.

**TRAFIKVARNING**

Inga kända risker.

### VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER LACRYVISC?

Eftersom man inte vet vilken effekt samtidig behandling med annan lokalbehandling i ögat har, bör du undvika att tillföra Lacryvisc samtidigt som andra ögondroppar.


### 7 HUR SKALL DU ANVÄNDA LACRYVISC?

1 - 2 droppar i det påverkade ögat högst 4 gånger dagligen såvida inte läkare ordinerat annorlunda.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

#### BRUKSANVISNING

Lacryvisc tillföres på följande sätt:



Figur 1



Figur 2



Figur 3

- a. Tvätta händerna före användning.
- b. Lossa en endosbehållare (se figur 1) och skaka den noga före användning.
- c. Sitt ner framför en spegel så att du kan se vad du gör.
- d. Vrid av toppen på endosbehållaren (se figur 2).
- e. Se till att inte spetsen på endosbehållare kommer i kontakt med andra föremål, eftersom detta kan förorena innehållet.
- f. Håll endosbehållare upp och ner i ena handen mellan tummen och pekfingeret.
- g. Dra ut undre ögonlocket på det berörda ögat med hjälp av andra handens pekfinger.
- h. Placera endosbehållaren nära ögat men inte i kontakt med detta. Tryck lätt ihop pipetten så att en eller två droppar faller ner i mellanrummet mellan ögat och ögonlocket (se figur 3).
- i. Släpp det nedre ögonlocket och blinka några gånger, så att hela ögat täcks av gelen.
- j. Upprepa stegen d - i ovan om även andra ögat skall behandlas.
- k. Kasta bort använda endosbehållare.

Om droppen inte stannar kvar i ögat efter droppning, skall ytterligare en droppe tillföras.

### VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

En för stor dos av Lacryvisc kan spolats ur ögat med ljummet kranvatten.

### 8 VILKA BIVERKNINGAR KAN LACRYVISC GE?

Lacryvisc tolereras vanligen väl vid rekommenderad dosering, men sveda, klåda och andra lokala reaktioner kan förekomma. Kontakta läkare vid misstanke om allvarlig biverkan.

Om Du upplever andra biverkningar, som Du tycker har förorsakats av Lacryvisc, berätta för Din läkare om dem.

### 9 HUR SKA LACRYVISC FÖRVARAS?

Lacryvisc ska förvaras i rumstemperatur.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

**10 VILKEN HÅLLBARHET HAR LACRYVISC?**

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. Innehållet i en endosbehållare ska användas omedelbart efter den har öppnats. Oanvänt innehåll skall inte sparas.

**11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN**

2007-03-21