

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Liktornsborttagning Scholl 40 % medicinskt plåster Salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Liktornsborttagning Scholl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Liktornsborttagning Scholl är och vad det används för
2. Innan du Liktornsborttagning Scholl
3. Hur du använder Liktornsborttagning Scholl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Liktornsborttagning Scholl ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD LIKTORNSBORTTAGNING SCHOLL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Liktornsborttagning Scholl innehåller salicylsyra. Salicylsyra är ett keratolytiskt medel som betyder att det mjukar upp förhårdnad hud.

Liktornsborttagning Scholl används för att effektivt och smärtfritt avlägsna liktornar.

2. INNAN DU ANVÄNDER LIKTORNSBORTTAGNING SCHOLL

Använd inte Liktornsborttagning Scholl

- om du är allergisk (överkänslig) mot salicylsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i Liktornsborttagning Scholl.
- om du är diabetiker eller har problem med blodcirkulationen.
- om huden kring liktorn är inflammerad eller sårig.
- på mollusker eller födelsemärken.

Var särskilt försiktig med Liktornsborttagning Scholl

Plåstret får inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon.

Avbryt behandlingen och ta bort plåstret om hudirritation uppstår.

Du ska inte använda plåstret på frisk hud utan plåstret ska endast liktornen.

Användning av andra läkemedel

Effekt av samtidig användning av andra läkemedel inklusive naturläkemedel har inte studerats.

Graviditet och amning

Då erfarenhet är begränsad kan användning av Liktornsborttagning Scholl inte rekommenderas under graviditet och amning.

3. HUR DU ANVÄNDER LIKTORNSBORTTAGNING SCHOLL

Vuxna och ungdomar över 16 år:

- Rengör och torka fötterna noga.
- Skrapa bort lös hud
- Fäst ett liktornsplåster på liktornen och täck med ett skyddande plåstret. Vid behov, klipp till liktornsplåstret så att det bara täcker liktorn och inte kommer i kontakt med frisk hud.
- Upprepa dagligen tills liktornen försvinner, dock inte längre än 2 veckor, om inte läkare rekommenderat annat.

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 16 år utan läkares ordination.

Om du använt för stor mängd av Liktornsborttagning Scholl

Om du använt för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig produkten av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Liktorn på tår Scholl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Det är osannolikt att du får biverkningar när du använder produkten rätt. Eventuell hudirritation är möjlig med vanligen inget att oroa sig för. Om du får mycket obehag, irritation eller överkänslighet, avbryt behandlingen.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

5. HUR LIKTORNSBORTTAGNING SCHOLL SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad förpackning ska användas inom 6 veckor.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är salicylsyra. Ett liktornsplåster innehåller 40 % salicylsyra, motsvarande 6,4 mg per plåster.
- Övriga innehållsämnen är polyvinylalkyleter, titandioxid (E171), flytande paraffin, 4,4'-tio-bis-2-tertbutyl-5-metylfenol, röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje förpackning innehåller 6 liktornsplåster och 6 skyddande plåster, 9 liktornsplåster och 9 skyddande plåster eller 12 liktornsplåster och 12 skyddande plåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

SSL International plc

1 Old Park Lane

Manchester

M41 7HA

Storbritannien

Ombud

SSL Healthcare Sverige AB

Box 1326

171 26 Solna

Denna bipacksedel godkändes senast: 2009-05-25