

BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Reparil N, gel.

2 VAD INNEHÅLLER REPARIL N?

100 g gel innehåller:

Aktiva ingredienser: Escin 1 g och dietylaminsalicylat 5 g.

Övriga ingredienser: Karbomerer, makrogol-6-glycerol-kaprylokaprat, natriumedetat, trometamol, isopropylalkohol, doftämnen (lavendelolja, pomeransblomolja), renat vatten.

3 HUR VERKAR REPARIL N?

Reparil N lindrar smärta och svullnad.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Madaus GmbH
511 01 Köln
Tyskland

Information lämnas av:

Algol Pharma AB
Hammarby fabriksväg 23
120 33 Stockholm
Tel. 08-615 27 60

5 VAD ANVÄNDS REPARIL N FÖR?

Lindrar vid tillfälliga smärtor och svullnader i samband med skador som stukningar, vrickningar och klämskador.

6 NÄR SKA REPARIL N INTE ANVÄNDAS?

Används ej på skadad hud, slemhinnor eller hudområden som utsätts för strålbehandling. Överkänslighet mot salicylater.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR REPARIL N ANVÄNDS:

Undvik att få Reparil N i ögonen. Om du får Reparil N i ögonen skölj rikligt med vatten.

GRAVIDITET

Om du är gravid bör du inte använda Reparil N på stora hudområden under längre tid.

AMNING

Om du ammar ska du inte smörja in bröstet med Reparil N.

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER REPARIL N?

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA REPARIL N?

Stryk ett tunt lager Reparil N gel på huden vid det skadade området en till två gånger dagligen beroende på besvärens svårighetsgrad. Upprepa behandlingen under 4-5 dagar. Man kan gnida in gelen i huden, men det är inte nödvändigt.

Om besvären kvarstår i mer än 4-5 dagar tag kontakt med läkare.

Använd inte Reparil N till barn under 12 år.

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?/VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du använt för stor mängd Reparil N kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Tel: 112).

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN REPARIL N GE?

Allergiska hudreaktioner har rapporterats. Kontakta läkare om du misstänker att Reparil N har gett dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA REPARIL N FÖRVARAS?

Förvaras i rumstemperatur.
Förvaras oåtkomligt för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR REPARIL N?

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2008-09-10