

# Användarinformation

## TRANS-VER-SAL® plåster 6 mm, 12 mm och 20 mm

### Vad innehåller TRANS-VER-SAL®?

Aktivt innehållsämne: Salicylsyra.  
Plåster 6 mm, 12 mm och 20 mm innehåller respektive 3,75 mg, 15,0 mg och 37,5 mg salicylsyra.

Övriga innehållsämnena:  
Karaya Gum, Propylenglykol,  
Polyetylen glykol-300, Quaternium-15.

### Hur verkar TRANS-VER-SAL®?

Den aktiva substansen i TRANS-VER-SAL® är salicylsyra som verkar uppmjukande och löser upp förhårdnade celler i vårtor och gör att dessa kan avlägsnas.

**Innehavare av försäljningstillstånd:** Bradley Pharmaceuticals, INC. 383 Route 46 West, Fairfield, NJ 07004, U.S.A.

### Ombud:

ALLDERMA AB - Epiderma, Industrihuset,  
430 64 Hällingsjö, tel. 0301-408 56.  
info@epiderma.se

### Vad används TRANS-VER-SAL® för?

För behandling av vårtor på händer och fötter.

### När ska TRANS-VER-SAL® inte användas?

Ska ej användas av de som är överkänsliga för salicylsyra eller annan beståndsdel i produkten. Ska ej användas av diabetiker eller personer med dålig blodcirkulation. Ska ej användas på irriterad, infekterad hud. Ska ej användas på molusker, födelsemärken, vårtor som det växer hår i, genitala vårtor, vårtor i ansiktet eller på slemhinnor.

### Att tänka på innan och när TRANS-VER-SAL® används

Plåstret bör ej komma i kontakt med slemhinnor i ögon. Om så skulle inträffa spola med mycket vatten. Avsluta behandlingen eller gör ett uppehåll om besvärande irritation på omgivande hud uppkommer. Vårtor smittar. Tvätta därför händerna efter beröring eller behandling av vårtor.

### Graviditet:

Vid användning av TRANS-VER-SAL® plåster kan det inte uteslutas att en liten mängd

salicylsyra tas upp via huden. Vid graviditet bör inte flera plåster användas samtidigt.

### Amning:

Vid användning av TRANS-VER-SAL® kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra går över i modersmjölken. Risk för påverkan på barnet som ammas är osannolik. TRANS-VER-SAL® kan därför användas under amning. Undvik dock att barnet kommer i kontakt med behandlat hudområde.

### Vad ska du undvika när du använder TRANS-VER-SAL®?

Effekten av samtidig applicering av andra läkemedel har inte studerats.

### Hur ska du använda TRANS-VER-SAL®?

Plåstret appliceras varje kväll innan sänggående och får verka över natten eller minst 8 timmar. På morgonen tas plåstret av och slängs. Behandlingen upprepas varje kväll tills vårtan är helt borta dock under högst 12 veckor. Rekommenderas ej till barn under 6 år.

### Bruksanvisning:

Se baksidan detta blad.

### Vad händer om du tagit för stor dos?

Det är inte känt att salicylsyra vid lokal behandling av vårtor skulle innebära risk för överdosering.

### Wilka biverkningar kan TRANS-VER-SAL® ge?

Hudirritation kan förekomma när plåstret kommer i kontakt med frisk hud. Avsluta behandlingen eller gör ett uppehåll om besvärande irritation på omgivande hud uppkommer. Kontaktallergi kan förekomma i individuella fall.

### Förvaring:

Plåstren förvaras i rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn.

### Hållbarhet:

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Datum för senaste revidering av denna bipacksedel: 2005-01-17.

## Bruksanvisning

### Gör så här:

Rekommenderad behandling på kvällen innan sänggående.

1. Tvätta området för vårtan. Torka noggrant. Fila vårtans yta varsamt med den fil som medföljer.
2. Applicera en droppe ljummet vatten på vårtan med hjälp av en bomullspinne, håll omgivande hud torr.
3. Vid behov klipp plåstret så att det bara täcker vårtan och inte kommer i kontakt med den friska huden.
4. Applicera plåstret med den blå sidan uppåt och gelen mot vårtan.
5. Fäst plåstret med den medföljande häftan. Tag av plåstret på morgonen (efter minst 8 timmar) och släng det. För bästa resultat av behandlingen skall då all gelen i plåstret vara borta.

Upprepa alla ovanstående behandlingssteg (1-5) varje kväll tills vårtan är helt borta dock under högst 12 veckor.

Förbättring ses ofta redan efter de första behandlingarna. Vårtan kan förväntas vara helt avlägsnad efter 3-12 veckors behandling.


**TRANS-VER-SAL® plåster finns i följande storlekar:**



6 mm



12 mm



20 mm

