

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Vårtplåster Scholl 40 % medicinskt plåster Salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Vårtplåster Scholl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Vårtplåster Scholl är och vad det används för
2. Innan du använder Vårtplåster Scholl
3. Hur du använder Vårtplåster Scholl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vårtplåster Scholl ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD VÅRTPLÅSTER SCHOLL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vårtplåster Scholl innehåller salicylsyra. Salicylsyra är ett keratolytiskt medel som betyder att det mjukar upp förhårdnad hud.

Vårtplåster Scholl används för att effektivt och smärtfritt avlägsna vårtor samtidigt som det döljer dem.

2. INNAN DU ANVÄNDER VÅRTPLÅSTER SCHOLL

Använd inte Vårtplåster Scholl

- om du är allergisk (överkänslig) mot salicylsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i Vårtplåster Scholl.
- om du är diabetiker eller har problem med blodcirkulationen.
- om huden kring vårtan är inflammerad eller sårig.
- på mollusker, födelsemärken eller vårtor det växer hår i.

Var särskilt försiktig med Vårtplåster Scholl

Plåstret får inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon.

Avbryt behandlingen och ta bort plåstret om hudirritation uppstår.

Du ska inte använda plåstret på frisk hud utan plåstret ska endast täcka vårtan.

Användning av andra läkemedel

Effekt av samtidig användning av andra läkemedel inklusive naturläkemedel har inte studerats.

Graviditet och amning

Då erfarenhet är begränsad kan användning av Vårtplåster Scholl inte rekommenderas under graviditet och amning.

3. HUR DU ANVÄNDER VÅRTPLÅSTER SCHOLL

Vuxna och barn över 6 år:

- Rengör och torka vårtan noga.
- Skrapa bort lös hud.
- Välj ett vårtplåster som precis täcker vårtan och täck sedan med ett skyddande plåster.
- Låt vårtplåstret sitta på plats under 48 timmar.
- Upprepa sedan behandlingen tills vårtan försvinner, i maximalt 12 veckor.

Rekommenderas inte till barn under 6 år.

Om du använt för stor mängd av Vårtplåster Scholl

Om du använt för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig produkten av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Vårtplåster Scholl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Det är osannolikt att du får biverkningar när du använder produkten rätt. Eventuell hudirritation är möjlig med vanligen inget att oroa sig för. Om du får mycket obehag, irritation eller överkänslighet, avbryt behandlingen.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

5. HUR VÅRTPLÅSTER SCHOLL SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad innerförpackning ska användas inom 6 veckor.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är salicylsyra. Ett vårtplåster innehåller 40 % salicylsyra, motsvarande 1,3 mg (ø 4 mm), 3,8 mg (ø 7 mm) och 7,8 mg (ø 10 mm).
- Övriga innehållsämnen är polyvinylalkyleter, titandioxid (E171), flytande paraffin, 4,4'-tio-bis-2-tertbutyl-5-metylfenol, röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlekar:

- 3 påsar med vardera 15 vårtplåster i storlekarna (i diameter): 4 mm, 7 mm och 10 mm, samt 15 skyddande plåster.

- 2 påsar med vardera 15 vårtplåster i storlekarna (i diameter): 4 mm, 7 mm och 10 mm, samt 10 skyddande plåster

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

SSL International plc

1 Old Park Lane

Manchester

M41 7HA

Storbritannien

Ombud

SSL Healthcare Sverige AB

Box 1326

171 26 Solna

Denna bipacksedel godkändes senast: 2009-05-25