

PRODUKTRESUMÉ

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Liktornsborttagning Scholl 40 % medicinskt plåster

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Salicylsyra 40 % w/w motsvarande 6,4 mg per plåster.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Medicinskt plåster

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

För behandling av liktornar på fötterna.

4.2 Dosering och administreringsätt

Vuxna och barn över 16 år:

Fötterna bör tvättas och torkas före användning. Ett liktornsplåster appliceras på liktornen och täcks med ett skyddande plåster. Vid behov, klipp till liktornsplåstret så att det bara täcker liktornen och inte kommer i kontakt med den normala huden.

Denna behandling upprepas dagligen tills liktornen kan avlägsnas.

Behandlingen bör ej pågå längre än två veckor, om inte läkare föreskrivit annat.

Rekommenderas ej till barn under 16 år utan läkares ordination.

4.3 Kontraindikationer

Skall inte användas av diabetiker eller personer med allvarliga cirkulationssjukdomar.

Skall inte användas om liktornen eller omgivande hud har sprickor eller är inflammerad.

Skall inte användas av personer som är överkänsliga mot salicylsyra eller annat innehållsämne i produkten.

Skall inte användas på mollusker eller födelsemärken.

4.4 Varningar och försiktighet

Plåstret får ej komma i kontakt med slemhinnor eller ögon.

Avbryt behandlingen och ta bort plåstret om hudirritation uppstår.

Använd ej på frisk hud.

Endast för utvärtes bruk.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Information saknas.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

Amning

Användning under amning kan inte rekommenderas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända risker.

4.8 Biverkningar

Lokal irritation och dermatit kan förekomma.

4.9 Överdoser

Systemisk toxicitet vid utvärtes applikation av salicylsyra i den mängd som ingår i produkten är ytterst osannolik på grund av de små mängder som appliceras.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: ATC-kod: D11A F

Salicylsyra i denna koncentration har keratolytisk effekt. Det mjukar upp hudförhårdnader genom att öka avstötningen av keratinlagret.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Salicylsyra kan absorberas vid utvärtes applicering. Salicylat i plasma är i hög grad proteinbundet och metaboliseras genom oxidation och konjugering och utsöndras till liten del oförändrat. Utsöndringen av salicylat följer första ordningens kinetik med en halveringstid på ca 4 timmar.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den aktiva substansens egenskaper är välkända men produktspecifika prekliniska data saknas.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Polyvinylalkyleter (låg molekylärt)

Polyvinylalkyleter (hög molekylärt)

Titandioxid (E171)

Paraffin, flytande

4,4'-tio-bis-2-tertbutyl-5-metylfenol

Järnoxid, röd (E172)

Järnoxid, svart (E172)

Silikoniserat stödpaper
Skyddande plåster av polypropylenfilm

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet för produkten i originalförpackning: 3 år
Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 veckor

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Förpackningen innehåller 6 medicinska plåster och 6 skyddande plåster, 9 medicinska plåster och 9 skyddande plåster eller 12 medicinska plåster och 12 skyddande plåster.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

SSL International plc
1 Old Park Lane
Manchester
M41 7HA
Storbritannien

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

23338

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2009-05-25

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2009-05-25