

Förteckningen utgör en sammanställning över karenstider för läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur och är baserad på respektive läkemedels godkända produktresumé (SPC). Streck (-) i tabellen, eller om rubrikerna *mjolk* eller *ägg* ej anges för en viss produkt, innebär att det inte finns någon fastställd karenstid för respektive djurslag och livsmedel. I ett antal fall är den angivna karenstiden knuten till vissa förbehåll som anges som fotnoter. Om karenstiderna är olika beroende på dos eller administreringsväg anges här den längsta karenstiden; exempelvis kan en lägre dos ha en kortare karenstid (se SPC). Ett fåtal läkemedel godkända för häst saknar fastställd karenstid och finns därmed inte med i förteckningen (Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver, dospåsar; Gentaject vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning; Myolaxin vet. 150 mg/ml infusionsvätska, lösning). De kan dock användas i enlighet med Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter (se respektive SPC för fullständig information).

Utskriven: 2009-11-02 14:27:23

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>A.E. Vaccin Nobilis vet., pulver till oral lösning</b>  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Adequanin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Adequanin vet., 250 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Advocin 180, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>                       | <b>Mjölk</b> | 4                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 8                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin</b>                  | <b>Slakt</b> | -                | 2    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 2        | -   | -    |
| <b>Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin</b>     | <b>Slakt</b> | -                | 2    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver</b>  | <b>Slakt</b> | -                | 2    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder</b>                            | <b>Slakt</b> | -                | 2    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Ampivet vet., 500 mg tablett</b>   | <b>Slakt</b> | 7                | 7    | -   | -   | 7    | -        | -   | -    |
| <b>Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension(#)</b>         | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Avipro Marek vet, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning(#)</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Axilur vet., 10 % oral suspension</b>                                     | <b>Mjölk</b> | 4                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 9                | -    | -   | -   | 5    | -        | -   | -    |
| <b>Axilur vet., 19 % oral pasta</b>  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 5    | -        | -   | -    |
| <b>Axilur vet., 2,5 % oral suspension</b>                                    | <b>Mjölk</b> | -                | -    | 6   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | 14  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Axilur vet., 22 % granulat</b>  | <b>Mjölk</b> | 5                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 9                | -    | -   | -   | 5    | -        | -   | -    |
| <b>Axilur vet., 4 % oralt pulver(*)</b>                                      | <b>Slakt</b> | -                | 4    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Banminth vet., 44 % oral pasta</b>  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Banminth vet., 77 % oralt pulver</b>                                      | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Baycox Bovis vet., 50 mg/ml oral suspension(⊘)</b>                   | <b>Slakt</b> | 63               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension till svin</b>                  | <b>Slakt</b> | -                | 77   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Baytical vet., 10 mg/ml pour-on, lösning</b>                         | <b>Mjolk</b> | 7                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 10               | -    | 10  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>                | <b>Mjolk</b> | 4                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 10               | 10   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Baytril vet., 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten(#)</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 3        | -   | -    |
|   |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
| <b>Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>                 | <b>Mjolk</b> | 4                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 10               | 10   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Benestermycin vet. intramammär salva(§)</b>                          | <b>Mjolk</b> | 30               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 35               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(⊘) Ej tillåtet till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(§) Karenstid: Mjolk: Behandlingstidpunkt mer än 4 veckor före kalvning: 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt 4-1 veckor före kalvning: 30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt mindre än 1 vecka före kalvning: 30 dygn efter kalvning.

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |   |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|---|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |   |
| <b>BevipleX vet., injektionsvätska, lösning</b>                         |              | <b>Mjolk</b>     | 0    | -   | 0   | -    | -        | -   | -    | - |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | 0    | 0   | -   | 0    | -        | -   | -    |   |
| <b>Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)</b>             |              | <b>Slakt</b>     | 49   | 28  | -   | -    | -        | -   | 28   | - |
| <b>Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta</b>                              |              | <b>Slakt</b>     | -    | -   | -   | -    | 14       | -   | -    | - |
| <b>Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)</b> |              | <b>Mjolk</b>     | 10   | -   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
|   | <b>Slakt</b> | 48               | 42   | -   | -   | 20   | -        | -   | -    |   |
| <b>Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>             |              | <b>Mjolk</b>     | 4    | -   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
|   | <b>Slakt</b> | 30               | 11   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Bovikalc vet., 43 g intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning</b> |              | <b>Mjolk</b>     | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension</b>              |              | <b>Mjolk</b>     | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

| Preparat   |       | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |   |
|--|-------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|---|
|  |       | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |   |
| <b>Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension</b> |       | Mjök             | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
|  | Slakt | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Boviseal vet, 2,6 g intramammarium, sintidsbehandling</b>                     |       | Mjök             | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
|  | Slakt | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>BTVPUR AlSap 8 injektionsvätska, suspension</b>                               |       | Slakt            | 0    | -   | 0   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Butador vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar</b>              |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |   |
| <b>Calphon vet., injektionsvätska, lösning</b>                                   |       | Mjök             | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
|  | Slakt | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Carepen vet., 600 mg intramammär suspension till lakterande ko</b>            |       | Mjök             | 6    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
|  | Slakt | 3                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt(Φ)</b>    |       | Slakt            | 2    | -   | -   | -    | 2        | -   | -    |   |

(Φ) Karenstid mjök: 12 timmar

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion</b> | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>              | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 4                | 4    | -   | -   | 4    | -        | -   | -    |
| <b>Cosecure vet. intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning</b>       | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Cronyxin vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)</b>             | <b>Mjolk</b> | 1                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 7                | -    | -   | -   | 7    | -        | -   | -    |
| <b>Cyclix, 250 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning</b>               | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 2                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel(λ)</b>           | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 64   | -        | -   | -    |
| <b>Cydectin vet, 18,92 mg/g oral gel för häst</b>                       | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 32   | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Cydectin vet., 1 mg/ml oral lösning(δ)</b>                         |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Mjolk</b> | -                | -    | 5   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | -                | -    | 14  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Dectomax pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning(¥)</b>             |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | 35               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Dectomax Suis vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>         |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | 56   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Dectomax vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(*) (¥)(β)</b>    |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | 49               | -    | 70  | -   | -    | -        | 42  | -    |
| <b>Denagard vet., 125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten</b> |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | 10   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Denagard vet., 2 % premix till medicinfoder</b>                    |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | 10   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>             |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | 28   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>             |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Mjolk</b> | 3                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 7                | 2    | -   | -   | 7    | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(β) Tackor som producerar mjölk för livsmedelsproduktion, skall ej behandlas i laktationsfas men kan behandlas fram till 70 dygn före lammning.

(δ) Gäller endast får. Övriga djurslag som producerar mjölk för human konsumtion eller är i sinperiod får ej behandlas.

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Dexafort vet., 3 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>                       |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Mjolk</b> | 6                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 53               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Dicural vet., 100 mg/ml oral lösning för kycklingar och kalkoner(#)</b>       |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 1        | -   | -    |
| <b>Dicural, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och hundar</b>     |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | 46               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett(φ)</b>                               |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Mjolk</b> | 2                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 7                | 7    | 7   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>                         |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 1                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt</b> |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Mjolk</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(Φ)</b>                       |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | 2                | -    | -   | -   | 2    | -        | -   | -    |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(Φ) Karenstid mjölk: 12 timmar

(φ) Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider , H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.

| Preparat   |       | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |   |
|--|-------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|---|
|  |       | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |   |
| <b>Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>  |       | Mjölk            | 0    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
|  | Slakt | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |   |
| <b>Domosedan vet., 7,6 mg/ml munhålegel</b>                |       | Mjölk            | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
|  | Slakt | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |   |
| <b>Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)</b>     |       | Slakt            | 49   | 33  | -   | -    | -        | -   | -    | - |
| <b>Droncit vet., 9 % oral gel</b>                          |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
| <b>Duvaxyn IE vet., injektionsvätska, lösning</b>          |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
| <b>Duvaxyn IE-T vet., injektionsvätska, suspension</b>     |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
| <b>Duvaxyn T vet., injektionsvätska, suspension</b>        |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
| <b>Duvaxyn WNV injektionsvätska, emulsion för hästar</b>   |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
| <b>Ecomectin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)(Ξ)</b> |       | Slakt            | 49   | 28  | 42  | -    | -        | -   | -    | - |

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(Ξ) Får ej ges till lakterande tackor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till får som är ämnade för produktion av mjölk för human konsumtion inom 60 dagar före lamning.

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Ecomectin, 18,7 mg/g oral pasta för häst(λ)</b>   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 34   | -        | -   | -    |
| <b>Econor, 0,5 % premix till medicinfoder för svin</b>                                     | <b>Slakt</b> | -                | 1    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Econor, 1 % premix till medicinfoder för svin</b>                                       | <b>Slakt</b> | -                | 1    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Econor, 10 % oralt pulver för svin</b>  | <b>Slakt</b> | -                | 1    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Econor, 10 % premix till medicinfoder för svin</b>                                      | <b>Slakt</b> | -                | 1    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Econor, 50 % premix till medicinfoder för svin</b>                                      | <b>Slakt</b> | -                | 1    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>ENERGAID, pulver till oral lösning</b>  | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Engemycin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)</b>                              | <b>Mjolk</b> | 7                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 21               | 14   | 21  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Enterisol Ileitis vet., frystorkat pulver och vätska till oral suspension till svin</b> | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning</b>  |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 15               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Equilis Resequin vet., injektionsvätska, suspension</b>                                     |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst</b> |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Equimax vet oral gel för häst(λ)</b>  |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 35   | -        | -   | -    |
| <b>Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tuggtablett för häst(⊞)</b>                                   |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 35   | -        | -   | -    |
| <b>EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst(λ)</b>  |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 26   | -        | -   | -    |
| <b>Equip F vet., injektionsvätska, suspension</b>  |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Equip FT vet., injektionsvätska, suspension</b>   |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Equip T vet., injektionsvätska, suspension</b>  |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |

(⊞) Ej tillåtet till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta(λ)</b>                                    | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 30   | -        | -   | -    |
| <b>Esbetre vet., 30 % pulver till oral lösning(#)</b>                            | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 16       | -   | -    |
| <b>Estrumat vet., 0,25 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>                       | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 1                | 1    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>Ethacilin Comp. vet., 200 mg/ml+200 mg/ml injektionsvätska, suspension(ε)</b> | <b>Mjolk</b> | 12               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 60               | 60   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Ethacilin vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>                    | <b>Mjolk</b> | 6                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 14               | 14   | 14  | -   | 14   | -        | -   | -    |
| <b>Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning</b>                       | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 5                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Finadyne vet., 25 mg/g granulat</b>   | <b>Mjolk</b> | 2                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 7                | -    | -   | -   | 7    | -        | -   | -    |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

(ε) Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.

| Preparat  |       | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|-------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |       | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension(*)</b>                                    |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Mjolk | 1                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | Slakt | 7                | 18   | -   | -   | 7    | -        | -   | -    |
| <b>Fyrantel vet, 40 % oral pasta</b>  |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Slakt | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Gallimune ND IB+EDS+ART, injektionsvätska, emulsion</b>  |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Slakt | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Gallimune ND+IB+ART, injektionsvätska, emulsion</b>  |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Slakt | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Gallimune ND+IB+EDS, injektionsvätska, emulsion</b>  |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Slakt | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>GastroGard, 370 mg/g oral pasta(λ)</b>   |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Slakt | -                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>Geopenil vet. pulver och vätska till injektionsvätska, lösning</b>                             |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Mjolk | 2                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | Slakt | 10               | 10   | -   | -   | 10   | -        | -   | -    |
| <b>Genestran vet, 75 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar och grisar</b> |       |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | Mjolk | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | Slakt | 1                | 1    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Gleptosil vet., 200 mg Fe3+/ml injektionsvätska, lösning</b>                              | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Gonazon, 1600 mikrog/ml injektionsvätska, lösning till laxfisk av honkön</b>              | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | 0    |
| <b>Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar(u)</b>   | <b>Slakt</b> | 13               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)</b>                     | <b>Mjölk</b> | 10               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 48               | 42   | -   | -   | 20   | -        | -   | -    |
| <b>Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta(*)</b>                                  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 10   | -        | -   | -    |
| <b>Hipracal-FM infusionsvätska, lösning</b>  | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Hipracin, 17 mikrog (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund</b> | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 0                | 0    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(u) Karenstid avser spädkalv

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Hiprasuis-P/E, injektionsvätska, suspension</b>            | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>         | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Hylartil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>      | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>       | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Hyoresp, injektionsvätska, suspension</b>                  | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Ibraxion, injektionsvätska, emulsion</b>                   | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Improvac injektionsvätska, lösning för svin</b>            | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension</b>        | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Ingelvac M. hyo vet., injektionsvätska, emulsion</b>       | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Insol Dermatophyton vet., injektionsvätska, suspension</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Isoba vet., 100 % inhalationsånga, vätska(λ)</b>     | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 2    | -        | -   | -    |
| <b>IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska</b>       | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 2    | -        | -   | -    |
| <b>Isopto-Atropin, 0,5 % ögondroppar, lösning</b>       | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | 0    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Isopto-Maxidex, 1 mg/ml ögondroppar, suspension</b>  | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | 0    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Isopto-Plain ögondroppar, lösning</b>                | <b>Mjölk</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Ivomec Comp oral pasta häst</b>                      | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 30   | -        | -   | -    |
| <b>Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning(¥)</b> | <b>Slakt</b> | 15               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder</b>      | <b>Slakt</b> | -                | 12   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning(ж)</b>                           | <b>Slakt</b> | -                | -    | 28  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)</b>               | <b>Slakt</b> | 49               | 28   | -   | -   | -    | -        | 28  | -    |
| <b>Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta(λ)</b>                             | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 14   | -        | -   | -    |
| <b>Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>              | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>               | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>Locatim, oral lösning</b>  | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Mamyzin vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension</b> | <b>Mjolk</b> | 6                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 10               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Marexine vet. pulver och vätska till injektionsvätska, lösning</b>   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
|   | <b>Ägg</b>   | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

(ж) Tackor som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Medicinal Oxygen Air Liquide Santé, 100% medicinsk gas, komprimerad</b>       | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Melovem, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin</b>        | <b>Slakt</b> | 15               | 5    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Metacam för häst, 15 mg/ml oral suspension</b>                                | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 3    | -        | -   | -    |
| <b>Metacam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>        | <b>Slakt</b> | 15               | 5    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> | <b>Mjolk</b> | 5                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 15               | 5    | -   | -   | 5    | -        | -   | -    |
| <b>Minifom, 100 mg/ml orala droppar, emulsion</b>                                | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 0                | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Mypravec Suis injektionsvätska, suspension</b>                                | <b>Slakt</b> | -                | 2    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Narcoxyl vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>             |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 1                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin</b>       |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | 71   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur</b> |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 9                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension</b>                 |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Netvax injektionsvätska, emulsion till kycklingar</b>             |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning</b>                 |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
|  | <b>Ägg</b>   | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion(#)</b>          |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion(Ω)</b>          |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(Ω) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion. Kan ges upp till 4 veckor före värping

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling(#)</b>                                | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobilis Influenza H7N1 injektionsvätska, emulsion</b>  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering(Ω)</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion(#)</b>   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension(#)</b>        | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension</b>   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
|   | <b>Ägg</b>   | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Nobivac Rabies vet., injektionsvätska, suspension</b>  | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | 0   | 0   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | -    | 0   | 0   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning(¥)</b>   | <b>Slakt</b> | 21               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(Ω) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion. Kan ges upp till 4 veckor före värping

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning(Ξ)</b>                         | <b>Slakt</b> | -                | -    | 10  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)</b>            | <b>Slakt</b> | 49               | 28   | -   | -   | -    | -        | 28  | -    |
| <b>Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta(λ)</b>                          | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 34   | -        | -   | -    |
| <b>Novem för nötkreatur och svin, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> | <b>Mjölk</b> | 5                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 15               | 5    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Novem för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>  | <b>Slakt</b> | 15               | 5    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Mjölk</b> | 3                | -    | -   | -   | 3    | -        | -   | -    |
| <b>Opticorten vet., 5 mg tablett</b>                                     | <b>Slakt</b> | 35               | 28   | -   | -   | 35   | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
| <b>Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten(#)</b>       | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

(Ξ) Får ej ges till lakterande tackor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till får som är ämnade för produktion av mjölk för human konsumtion inom 60 dagar före lamning.

| Preparat   |       | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |   |
|--|-------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|---|
|  |       | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |   |
| <b>Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning</b>       |       | Mjök             | 0    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
|  | Slakt | 0                | 0    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |   |
| <b>Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension</b>           |       | Slakt            | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Penovet vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>    |       | Mjök             | 6    | -   | 6   | 6    | 6        | -   | -    |   |
|  | Slakt | 14               | 14   | 14  | 14  | 14   | -        | -   | -    |   |
| <b>Pigeron vet., 100 mg fe 3+/ml injektionsvätska, lösning</b> |       | Mjök             | 0    | -   | 0   | -    | -        | -   | -    |   |
|  | Slakt | 0                | 0    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Pigeron vet., 200 mg fe3+/ml injektionsvätska, lösning</b>  |       | Mjök             | 0    | -   | 0   | -    | -        | -   | -    |   |
|  | Slakt | 0                | 0    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Pirsue, 5 mg/ml intramammär lösning</b>                     |       | Mjök             | 5    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
|  | Slakt | 23               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Plegicil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>       |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 90       | -   | -    |   |

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension</b>              | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension</b>               | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis Ery vet., injektionsvätska, suspension</b>              | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion</b>          | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis M Hyo injektionsvätska, suspension</b>                  | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis Parvo vet., injektionsvätska, suspension</b>            | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion</b>                    | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension</b> | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Porcilis Porcoli, injektionsvätska, emulsion</b>                 | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Poulvac Flufend H5N3 RG injektionsvätska, emulsion(#)</b>        | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Previcox, 8,2 mg/g oral pasta för hästar</b>                                   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 26   | -        | -   | -    |
| <b>Prosolvin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>                        | <b>Mjölk</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 1                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>ProteqFlu injektionsvätska, suspension</b>                                     | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>ProteqFlu injektionsvätska, suspension för häst</b>                            | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension</b>                                  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension för häst</b>                         | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>ProteqFlu-Te, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Provid, 44 % oral pasta(λ)</b>   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder</b>                                 | <b>Slakt</b> | -                | 7    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst(λ)</b>             | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 12   | -        | -   | -    |
| <b>Qualimec, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)(Ξ)</b>     | <b>Slakt</b> | 49               | 28   | 42  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension</b>    | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | 0   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | -    | 0   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Rapidexon vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>      | <b>Mjolk</b> | 3                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 7                | 2    | -   | -   | 11   | -        | -   | -    |
| <b>Receptal vet., 4,2 mikrog/ml injektionsvätska, lösning</b> | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Rifen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>        | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 4                | 4    | -   | -   | 4    | -        | -   | -    |
| <b>Rimadyl Bovis vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 21               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

(Ξ) Får ej ges till lakterande tackor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till får som är ämnade för produktion av mjölk för human konsumtion inom 60 dagar före lamning.

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |   |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|---|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |   |
| <b>Rintal vet., 10 % granulat för svin, häst, nöt och får(*)</b>     |              | <b>Mjolk</b>     | 5    | -   | 7   | -    | -        | -   | -    | - |
|  | <b>Slakt</b> | 7                | 10   | 21  | -   | 21   | -        | -   | -    |   |
| <b>Rintal vet., 10 % oral suspension för nöt, får och häst(*)</b>    |              | <b>Mjolk</b>     | 5    | -   | 7   | -    | -        | -   | -    | - |
|  | <b>Slakt</b> | 7                | -    | 21  | -   | 21   | -        | -   | -    |   |
| <b>Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>             |              | <b>Mjolk</b>     | 0    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
|  | <b>Slakt</b> | 4                | 4    | -   | -   | 4    | -        | -   | -    |   |
| <b>Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>               |              | <b>Mjolk</b>     | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
|  | <b>Slakt</b> | 1                | -    | 2   | -   | 1    | -        | -   | -    |   |
| <b>Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur</b> |              | <b>Mjolk</b>     | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
|  | <b>Slakt</b> | 0                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |   |
| <b>Ruvax vet., injektionsvätska, suspension</b>                      |              | <b>Slakt</b>     | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
| <b>Sebacil pour on vet., 75 mg/ml pour-on, lösning</b>               |              | <b>Slakt</b>     | -    | 16  | -   | -    | -        | -   | -    | - |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning</b>        | <b>Slakt</b> | -                | 21   | 28  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>             | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 10   | -        | -   | -    |
| <b>Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat</b>                    | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 0                | 0    | 0   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> | <b>Mjolk</b> | 0                | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 2                | 2    | 2   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Siccalactin vet. intramammär salva(Θ)</b>                        | <b>Mjolk</b> | 30               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 35               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Socetyl vet., 500 mg oral/kutan pasta</b>                        | <b>Mjolk</b> | 3                | -    | 3   | 3   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 7                | 7    | 7   | 7   | 7    | -        | -   | -    |
| <b>Spiramycin vet., 260 000 IE/ml injektionsvätska, lösning</b>     | <b>Mjolk</b> | 8                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 28               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(Θ) Leverans av mjölk får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller längre tid före kalvning. Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 veckor före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning. Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare tid före kalvning

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Stellamune One vet., injektionsvätska, emulsion</b>                             | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Streptocillin vet., 200 mg/200 mg intramammär salva</b>                         | <b>Mjolk</b> | 6                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 10               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>      | <b>Mjolk</b> | 12               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 60               | 60   | 60  | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Suvaxyn Aujeszky 783+O/W, injektionsvätska, emulsion</b>                        | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Suvaxyn PCV injektionsvätska, suspension för gris</b>                           | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Synulox vet., 140 mg/ml + 35 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>             | <b>Slakt</b> | -                | 31   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Systemex Repidose vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning(Ⓔ)</b> | <b>Slakt</b> | 180              | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(Ⓔ) Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas. Karenstidsförsäkring ingår

| Preparat  |  | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |   |
|---|--|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|---|
|   |  | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |   |
| <b>Terramycin vet., 20 % oralt pulver</b>                                       |  | <b>Slakt</b>     | 10   | 10  | -   | -    | -        | 14  | -    | - |
|   |  | <b>Ägg</b>       | -    | -   | -   | -    | -        | 7   | -    | - |
| <b>Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett</b>                              |  | <b>Mjolk</b>     | 2    | -   | 2   | -    | -        | -   | -    | - |
|   |  | <b>Slakt</b>     | 7    | 10  | 10  | -    | -        | -   | -    | - |
| <b>Tetanusvaccin vet., 27 flockningsenheter/ml injektionsvätska, suspension</b> |  | <b>Slakt</b>     | -    | -   | -   | -    | 0        | -   | -    | - |
| <b>Tetroxy prolongatum vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>             |  | <b>Mjolk</b>     | 7    | -   | 7   | -    | -        | -   | -    | - |
|   |  | <b>Slakt</b>     | 21   | 28  | 28  | -    | -        | -   | -    | - |
| <b>Tokosel vet., 20 mg/g+0,4 mg/g oralt pulver</b>                              |  | <b>Mjolk</b>     | 0    | -   | 0   | -    | -        | -   | -    | - |
|   |  | <b>Slakt</b>     | 0    | 0   | 0   | -    | 0        | 0   | -    | - |
|   |  | <b>Ägg</b>       | -    | -   | -   | -    | -        | 0   | -    | - |
| <b>Toxicol vet. injektionsvätska, suspension</b>                                |  | <b>Slakt</b>     | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    | - |

| Preparat  |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|---|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|   |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Tribrissen vet. injektionsvätska, suspension(*)</b>          |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Mjolk</b> | 14               | -    | 14  | -   | 14   | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 68               | 60   | 68  | -   | 28   | -        | -   | -    |
| <b>Tribrissen vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta till häst</b> |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 10   | -        | -   | -    |
| <b>Trimediazin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver(*)</b>     |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 20   | -        | -   | -    |
| <b>Twinhip Vet., 439 mg/g oral pasta(λ)</b>                     |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |
| <b>Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder</b>                |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder</b>                 |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | 0    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>          |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Mjolk</b> | 7                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|   | <b>Slakt</b> | 35               | 21   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning(#)</b>             |              |                  |      |     |     |      |          |     |      |
|   | <b>Slakt</b> | -                | 1    | -   | -   | -    | 2        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

| Preparat  |       | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |   |
|---|-------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|---|
|   |       | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |   |
| <b>Ultraplex vet. injektionsvätska, lösning</b>                                     |       | Mjölk            | 0    | -   | 0   | -    | -        | -   | -    | - |
|   | Slakt | 28               | 28   | 28  | -   | -    | -        | -   | -    | - |
| <b>Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning</b>                                      |       | Mjölk            | 0    | -   | 0   | -    | -        | -   | -    | - |
|   | Slakt | 28               | 28   | 28  | -   | 28   | -        | -   | -    | - |
| <b>Ursoferran vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>                         |       | Slakt            | -    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    | - |
| <b>Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension</b>                                      |       | Slakt            | -    | -   | 14  | -    | -        | -   | -    | - |
| <b>VangRab injektionsvätska, suspension</b>   |       | Mjölk            | 0    | -   | 0   | 0    | 0        | -   | -    | - |
|   | Slakt | 0                | 0    | 0   | 0   | 0    | -        | -   | -    | - |
| <b>Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension(#)</b> |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | -        | 0   | -    | - |
| <b>Vectin vet, 22,75 mg tuggtablett för häst</b>                                    |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 52       | -   | -    | - |
| <b>Ventipulmin vet., 16 mikrog/g granulat</b>                                       |       | Slakt            | -    | -   | -   | -    | 28       | -   | -    | - |

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

| Preparat   |              | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|--------------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |              | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| <b>Ventipulmin vet., 25 mikrog/ml oral lösning</b>                             | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 28   | -        | -   | -    |
| <b>Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)</b>                   | <b>Mjölk</b> | 4                | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 21               | 15   | -   | -   | 21   | -        | -   | -    |
| <b>Virbamec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)</b>                    | <b>Slakt</b> | 49               | 28   | -   | -   | -    | -        | 28  | -    |
| <b>Virbamec, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur(¥)</b>                    | <b>Slakt</b> | 28               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>                     | <b>Mjölk</b> | 3                | -    | -   | -   | 3    | -        | -   | -    |
|  | <b>Slakt</b> | 35               | 28   | -   | -   | 35   | -        | -   | -    |
| <b>Xento vet., injektionsvätska, suspension</b>                                | <b>Slakt</b> | -                | 0    | 0   | -   | -    | -        | -   | -    |
| <b>Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrog/ml injektionsvätska, lösning(*)</b> | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| <b>Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning</b>                                  | <b>Slakt</b> | -                | -    | -   | -   | 0    | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

| Preparat   |       | Karenstid (dygn) |      |     |     |      |          |     |      |
|--|-------|------------------|------|-----|-----|------|----------|-----|------|
|  |       | Nöt              | Svin | Får | Get | Häst | Fjäderfä | Ren | Fisk |
| Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)          | Slakt | -                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| Xylocain, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)          | Slakt | -                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| Xylocain, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)           | Slakt | -                | -    | -   | -   | 1    | -        | -   | -    |
| ZACTRAN, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk(¥) | Slakt | 64               | -    | -   | -   | -    | -        | -   | -    |
| Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin                  | Slakt | -                | 21   | -   | -   | -    | -        | -   | -    |

(\*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.