

Karenstider för veterinärläkemedel

Förteckningen utgör en sammanställning över karenstider för läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur och är baserad på respektive läkemedels godkända produktresumé (SPC). Streck (-) i tabellen, eller om rubrikerna *mjolk* eller *ägg* ej anges för en viss produkt, innebär att det inte finns någon fastställd karenstid för respektive djurslag och livsmedel. I ett antal fall är den angivna karenstiden knuten till vissa förbehåll som anges under respektive karenstid. Förbehåll kan också gälla på produktnivå och anges då under läkemedelsnamnet. Ett fåtal läkemedel godkända för häst saknar fastställd karenstid och finns därmed inte med i förteckningen (Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver, dospåsar; Gentaject vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning; Plegicil vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning). De kan dock användas i enlighet med Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter (se respektive SPC för fullständig information).

Utskriven: 2011-06-10 16:21:52

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Adequanin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Adequanin vet., 250 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Advocin 180, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g oralt pulver										
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin										
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion. Skall ej användas inom 14 dagar före äggläggningens början.	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Ampivet vet., 500 mg tablett	Slakt	7	7	-	-	7	-	-	-	-	-
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Avipro Marek vet, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Avipro Thymovac vet. frystorkat pulver för användning i dricksvatten	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Axilur vet., 10 % oral suspension	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 19 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	Mjök	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Axilur vet., 2,5 % oral suspension	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Axilur vet., 22 % granulat	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Axilur vet., 4 % oralt pulver	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vid normal dos, 5 mg/kg.									
	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid ökad dos, 25 mg/kg.										
Banminth vet., 44 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Banminth vet., 77 % oralt pulver	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Baycox Bovis vet., 50 mg/ml oral suspension Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension till svin	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns	Slakt	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		Efter andra behandlingen.									
	Ägg	-	-	-	-	-	12h	-	-	-	-
		Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.									
Bayticol vet., 10 mg/ml pour-on, lösning Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Benestermycin vet. intramammär salva	Mjök	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Behandlingstidpunkt mer än 4 veckor före kalvning: 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt 4-1 veckor före kalvning: 30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt mindre än 1 vecka före kalvning: 30 dygn efter kalvning.									
	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	28	-	-	-
Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn										
	Mjök	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn										
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn										
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn											
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-		
BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-		
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bovilis BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Boviseal vet, 2,6 g intramammär suspension mjölkkor vid sinläggning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 1 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 1-8 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 2-4 injektionsvätska, suspension	Mjök	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjolk	12h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Compagel vet. gel för häst Skall ej ges till dräktiga eller lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Coopermec Vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	31	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosecure vet. intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get	Slakt	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Cronyxin vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
										1 dygn efter intravenös injektion
	Slakt	-	-	-	-	7	-	-	-	-
										7 dygn efter intramuskulär injektion
Cyclix, 250 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	64	-	-	-	-
Cydectin vet., 18,92 mg/g oral gel för häst	Slakt	-	-	-	-	32	-	-	-	-
Cydectin vet., 1 mg/ml oral lösning Gäller endast får. Övriga djurslag som producerar mjölk för human konsumtion eller är i sinperiod får ej behandlas.	Mjolk	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
Dectomax pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Skall ej ges till lakterande kor, som producerar mjölk för humankonsumtion eller till sinkor eller dräktiga kvigor i mjölkproducerande besättningar närmare kalvning än 60 dygn.	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Dectomax Suis vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	56	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dectomax vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Sinkor och kvigor i mjölkproducerande besättningar skall ej behandlas närmare kalvning än 60 dygn. Tackor som producerar mjölk för livsmedelsproduktion, skall ej behandlas i laktationsfas men kan behandlas fram till 70 dygn före lammning.	Slakt	49	-	70	-	-	-	42	-	-	-
	Denagard vet., 125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Denagard vet., 20 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Slakt	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
	Förebyggande (vid 2,0 mg/kg kroppsvikt): 1 dag Behandling (vid 5 -10 mg/kg kroppsvikt): 6 dagar										
	Slakt	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	Hönor Slakt: 1 dag Kalkoner Slakt: 4 dagar										
Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Karens ägg 0 dagar avser hönor											
Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	11	-	-	-	-	-	-	-	
	Detonervin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjök	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	7	-	-	-	-	-
Dexafort vet., 3 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicural vet., 100 mg/ml oral lösning för kycklingar och kalkoner Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Dicural, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och hundar	Slakt	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Dinalgen vet, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
ENERGAID, pulver till oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Engemycin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mjölk	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
		vid doser upp till 10 mg/kg kroppsvikt/dygn									
	Slakt	30	8	18	-	-	-	-	-	-	
Enrofloxacin N-vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt	Mjölk	84h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterisol Ileitis vet., frystorkat pulver och vätska till oral suspension till svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	
Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Resequin vet., injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equiparin vet, 50 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equiparin vet, 500 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	12h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Eraquell vet., 20 mg tugtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Esbetre vet., 30 % pulver till oral lösning Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
Estrumat vet., 0,25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ethacilin Comp. vet., 200 mg/ml+200 mg/ml injektionsvätska, suspension Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.	Mjök	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Ethacilin vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	-	14	-	-	-	-
Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Finadyne vet., 25 mg/g granulat	Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt im	7	-	-	-	7	-	-	-	-
	Slakt iv	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 250 mg granulat till häst	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-
	Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för human konsumtion									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nöt och svin Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	22	-	-	7	-	-	-	-	-
Fyrantel vet, 400 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Gallimune ND IB+EDS+ART, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gallimune ND+IB+ART, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gallimune ND+IB+EDS, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
GastroGard, 370 mg/g oral pasta Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Genestran vet, 75 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar och grisar	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Gleptosil vet., 200 mg Fe ³⁺ /ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Gonazon, 1600 mikrog/ml injektionsvätska, lösning till laxfisk av honkön	Slakt	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Gripovac 3 injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Karenstid avser spädkalv									
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		vid administrering 2 gånger per dygn.									
	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		vid administrering en gång per dygn									
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-	
		vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn									
	Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-	
		vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion									
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-	
		vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn									
	Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-	
		vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hipotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin, 17 mikrog (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Hipracox oral suspension för användning i dricksvatten	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Hipracox spray suspension och lösning till spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Hiprasuis-P/E, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hylartil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Hyoresp, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibraxion, injektionsvätska, emulsion nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Improvac injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac M. hyo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Isoba vet., 100 % inhalationsånga, vätska Ska ej användas till duvor avsedda för humankonsumtion. Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Isopto-Atropin, 0,5 % ögondroppar, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Isopto-Maxidex, 1 mg/ml ögondroppar, suspension	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Isopto-Plain ögondroppar, lösning	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Ivomec Comp oral pasta häst Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder	Slakt	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning Tackor och getter som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	Slakt	-	-	6	8	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta Får inte användas till ston som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Locatim, oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamyzin vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjolk	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marexine vet. pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Melovem, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
MELOXIDYL, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Metacam för häst, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Metacam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Metacam för svin, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Minifom, 100 mg/ml orala droppar, emulsion	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Moxidectin/Triklabendazol Fort Dodge, 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning till får	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-	-
Mypravac Suis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Narcoxyl vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	71	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutant vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.										
Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Netvax injektionsvätska, emulsion till kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Marexine CA 126 koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjolk	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta Ivermektin skall ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Novem för nötkreatur och svin, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Paracox-5 vet., koncentrat till oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	6	-	6	6	6	-	-	-	-
Penovet vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	14	14	14	14	14	-	-	-	-
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Pigeron vet., 100 mg fe 3+/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Poulvac Flufend H5N3 RG injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Previcox, 8,2 mg/g oral pasta för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Procopen vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur, svin, hästar Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	15	-	-	14	-	-	-	-
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu-Te, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Rapidexon vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	11	-	-	-	-	-
Receptal vet., 4,2 mikrog/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
RESPIPORC FLU3 injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheumocam, 15 mg/ml oral suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sebacil pour on vet., 75 mg/ml pour-on, lösning	Slakt	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning	Slakt	-	21	28	-	-	-	-	-	-	-
Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.	Mjölk	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Suiseng vet. injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn Aujesky 783+O/W, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Synulox vet., 140 mg/ml + 35 mg/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Systemex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tailan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
Terramycin vet., 20 % oralt pulver	Slakt	10	10	-	-	-	14	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjölk	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tetanusvaccin vet., 27 flockningsenheter/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	7	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	21	28	28	-	-	-	-	-	-	
ThoroVAX vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Torphasol vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Toxicol vet. injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tribrissen vet., 400 mg/ml+80 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjolk	7	-	7	-	7	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen										
	Mjolk	14	-	14	-	14	-	-	-	-	
	Dosering 2 gånger dagligen										
	Slakt	34	30	34	-	-	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen, intramuskulär injektion										
Slakt	14	-	-	-	14	-	-	-	-		
Dosering 1 gång dagligen, intravenös injektion											
Slakt	68	60	68	-	-	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intramuskulär injektion											
Slakt	28	-	-	-	28	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intravenös injektion											
Trimediazin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen										
Slakt	-	-	-	-	20	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen:											
Twinhip vet., 439 mg/g oral pasta Mjolk från ston får ej användas för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	35	21	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-
Ursoferran vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
VangRab injektionsvätska, suspension										
	Mjolk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vectin vet, 22,75 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	52	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Virbamec, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur Virbamec får ej ges till lakterande kor som producerar mjölk för human konsumtion. Dräktiga kor som skall producera mjölk för human konsumtion får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	60h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrog/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Xylocain, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<= 400 mg									
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	> 400 mg									
ZACTRAN, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.	Slakt	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin	Slakt	-	21	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Zulvac 1+8 Ovis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 8 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 8 Ovis injektionsvätska, suspension för får	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-