

Karenstider för veterinärläkemedel

Förteckningen utgör en sammanställning över karenstider för läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur och är baserad på respektive läkemedels godkända produktresumé (SPC). Streck (-) i tabellen, eller om rubrikerna *mjök* eller *ägg* ej anges för en viss produkt, innebär att det inte finns någon fastställd karenstid för respektive djurslag och livsmedel. I ett antal fall är den angivna karenstiden knuten till vissa förbehåll som anges under respektive karenstid. Förbehåll kan också gälla på produktnivå och anges då under läkemedelsnamnet. Ett fåtal läkemedel godkända för häst saknar fastställd karenstid och finns därmed inte med i förteckningen (Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver, dospåsar; Gentaject vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning; Myolaxin vet. 150 mg/ml infusionsvätska, lösning; Plegicil vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning) . De kan dock användas i enlighet med Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter (se respektive SPC för fullständig information).

Utskriven: 2010-05-27 13:07:41

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
A.E. Vaccin Nobilis vet., pulver till oral lösning										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Adequanin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Adequanin vet., 250 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Advocin 180, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g oralt pulver										
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion. Skall ej användas inom 14 dagar före ägglägningens början.	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Ampivet vet., 500 mg tablett	Slakt	7	7	-	-	7	-	-	-	-
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Banminth vet., 44 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Banminth vet., 77 % oralt pulver	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Baycox Bovis vet., 50 mg/ml oral suspension Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension till svin	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-	-
Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns	Slakt	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Efter andra behandlingen.								
	Ägg	-	-	-	-	-	12h	-	-	-
		Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.								
Baytical vet., 10 mg/ml pour-on, lösning Baytical vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjök	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	10	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Benestermycin vet. intramammär salva	Mjölk	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Behandlingstidpunkt mer än 4 veckor före kalvning: 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt 4-1 veckor före kalvning: 30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt mindre än 1 vecka före kalvning: 30 dygn efter kalvning.									
	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn									
	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn									
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn									
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-	
Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn										
Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-	
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn										
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-	
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn										
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-	
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Boviseal vet, 2,6 g intramammär suspension mjölkkor vid sinläggning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 8 injektionsvätska, suspension	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Butador vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Calphon vet., injektionsvätska, lösning	Mjolk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Carepen vet., 600 mg intramammär suspension till lakterande ko	Mjolk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Ceftiofur N-vet, 50 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning till nöt och svin	Mjolk	12h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjolk	12h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-
Compagel vet. gel för häst Skall ej ges till dräktiga eller lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Cosecure vet. intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Cronyxin vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt 1 dygn efter intravenös injektion	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt 7 dygn efter intramuskulär injektion	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Cyclix, 250 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	64	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	7	-	-	-	-
Dexafort vet., 3 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicural vet., 100 mg/ml oral lösning för kycklingar och kalkoner Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Dicural, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och hundar	Slakt	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-
Dinalgen vet., 150 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt										
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjök	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Domosedan vet., 7,6 mg/ml munhålegel										
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjök för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.	Slakt	49	33	-	-	-	-	-	-	-
Droncit vet., 9 % oral gel										
Skall inte användas till ston vars mjök används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Duvaxyn IE vet., injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Duvaxyn IE-T vet., injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equiparin vet, 50 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equiparin vet, 500 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	12h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-
Eraquell vet., 20 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Esbetre vet., 30 % pulver till oral lösning Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	16	-	-	-
Estrumat vet., 0,25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Ethacilin Comp. vet., 200 mg/ml+200 mg/ml injektionsvätska, suspension Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.	Mjolk	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Ethacilin vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjolk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	-	14	-	-	-	-
Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Finadyne vet., 25 mg/g granulat	Mjolk	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt im	7	-	-	-	7	-	-	-	-
	Slakt iv	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nöt och svin Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Mjölk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	22	-	-	7	-	-	-	-
Fyrantel vet, 400 mg/g oral pasta										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gallimune ND IB+EDS+ART, injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gallimune ND+IB+ART, injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gallimune ND+IB+EDS, injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
GastroGard, 370 mg/g oral pasta Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjolk	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-	-
Genestran vet, 75 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar och grisar	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Gleptosil vet., 200 mg Fe ³⁺ /ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Gonazon, 1600 mikrog/ml injektionsvätska, lösning till laxfisk av honkön	Slakt	-	-	-	-	-	-	0	-
Gripovac 3 injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-
		Karenstid avser spädkalv								

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	vid administrering 2 gånger per dygn.									
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	vid administrering en gång per dygn									
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn									
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-	
vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion										
Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-	
vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn										
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-	
vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion										
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin, 17 mikrog (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjolk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Hipracox oral suspension för användning i dricksvatten	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Hipracox spray suspension och lösning till spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Hiprasuis-P/E, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Hylartil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Hyoresp, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ibraxion, injektionsvätska, emulsion	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Improvac injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac M. hyo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder	Slakt	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning Tackor som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	Slakt	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta Får inte användas till ston som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Locatim, oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamyzin vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Marexine vet. pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Medicinal Oxygen Air Liquide Santé, 100% medicinsk gas, komprimerad	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Melovem, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
MELOXIDYL, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Metacam för häst, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Minifom, 100 mg/ml orala droppar, emulsion	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Moxidectin/Triklabendazol Fort Dodge, 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning till får	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Narcoxyl vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	71	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutant vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.									
Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Influenza H7N1 injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Marexine CA 126 koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta Ivermektin skall ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Paracox-5 vet., koncentrat till oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Penovet vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	6	6	6	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	14	14	-	-	-	-
Pigeron vet., 100 mg fe 3+/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pigeron vet., 200 mg fe3+/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pirsue, 5 mg/ml intramammär lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Porcilis Ery vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis M Hyo injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Parvo vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Poulvac Flufend H5N3 RG injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Previcox, 8,2 mg/g oral pasta för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Procapen vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur, svin, hästar Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	15	-	-	14	-	-	-	-
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Rintal vet., 10 % granulat för svin, häst, nöt och får										
Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mjök vid dosen 10 mg/kg	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Mjök vid dosen 5 mg/kg	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Slakt	7	-	-	-	21	-	-	-	-	-
Slakt vid dosen 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
Slakt vid dosen 20 mg/kg	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Slakt vid dosen 5 mg/kg	-	6	14	-	-	-	-	-	-	-
Rintal vet., 10 % oral suspension för nöt, får och häst										
Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mjök vid dosen 10 mg/kg	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Mjök vid dosen 5 mg/kg	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Slakt	7	-	-	-	21	-	-	-	-	-
Slakt vid dosen 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
Slakt vid dosen 5 mg/kg	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-
Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sebacil pour on vet., 75 mg/ml pour-on, lösning	Slakt	-	16	-	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning	Slakt	-	21	28	-	-	-	-	-	-
Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Siccalactin vet. intramammär salva	Mjök	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Socetyl vet., 500 mg oral/kutan pasta	Mjök	3	-	3	3	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	7	7	-	-	-	-
Spiramycin vet., 260 000 IE/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-
STARTVAC injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellamune One vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Streptocillin vet., 200 mg/200 mg intramammär salva										
	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension										
Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.										
	Mjölk	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	60	-	-	-	-	-	-
Suiseng vet. injektionsvätska, suspension för svin										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn Aujeszky 783+O/W, injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PCV injektionsvätska, suspension för gris										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Synulox vet., 140 mg/ml + 35 mg/ml injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	31	-	-	-	-	-	-	-
Systamex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning										
Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.										
	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Tailan vet., 83 % pulver till oral lösning										
Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.										
	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Terramycin vet., 20 % oralt pulver	Slakt	10	10	-	-	-	14	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjolk	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-	-
Tetanusvaccin vet., 27 flockningsenheter/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjolk	7	-	7	-	-	-	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	21	28	28	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ThoroVAX vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tokosel vet., 20 mg/g+0,4 mg/g oralt pulver	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Toxicol vet. injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Tribrissen vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta till häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Tribrissen vet., 400 mg/ml+80 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök Dosering 1 gång dagligen	7	-	7	-	7	-	-	-	-
	Mjök Dosering 2 gånger dagligen	14	-	14	-	14	-	-	-	-
	Slakt Dosering 1 gång dagligen, intramuskulär injektion	34	30	34	-	-	-	-	-	-
	Slakt Dosering 1 gång dagligen, intravenös injektion	14	-	-	-	14	-	-	-	-
	Slakt Dosering 2 gånger dagligen, intramuskulär injektion	68	60	68	-	-	-	-	-	-
	Slakt Dosering 2 gånger dagligen, intravenös injektion	28	-	-	-	28	-	-	-	-
Trimediazin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver	Slakt Dosering 1 gång dagligen	-	-	-	-	10	-	-	-	-
	Slakt Dosering 2 gånger dagligen:	-	-	-	-	20	-	-	-	-
Twinhip Vet., 439 mg/g oral pasta Mjök från ston får ej användas för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	35	21	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-
Ursoferran vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
VangRab injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vectin vet, 22,75 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	52	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Ventipulmin vet., 16 mikrog/g granulat	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 25 mikrog/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Verminator, 100 mg/g oral emulsion	Slakt	-	4	-	-	-	4	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
	Slakt	-	-	-	-	21	-	-	-	-
	Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:									
	Slakt	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
	Slakt	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
Virbamec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.										
Virbamec, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Virbamec får ej ges till lakterande kor som producerar mjölk för human konsumtion. Dräktiga kor som skall producera mjölk för human konsumtion får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.										

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	60h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrog/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	
Xylocain, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<= 400 mg									
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	> 400 mg									
ZACTRAN, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.										
	Slakt	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin										
	Slakt	-	21	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 8 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur										
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 8 Ovis injektionsvätska, suspension för får										
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-