

Karenstider för veterinärläkemedel

Förteckningen utgör en sammanställning över karenstider för läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur och är baserad på respektive läkemedels godkända produktresumé (SPC). Streck (-) i tabellen, eller om rubrikerna *mjolk* eller *ägg* ej anges för en viss produkt, innebär att det inte finns någon fastställd karenstid för respektive djurslag och livsmedel. I ett antal fall är den angivna karenstiden knuten till vissa förbehåll som anges under respektive karenstid. Förbehåll kan också gälla på produktnivå och anges då under läkemedelsnamnet. Ett fåtal läkemedel godkända för häst saknar fastställd karenstid och finns därmed inte med i förteckningen (Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver, dospåsar; Gentaject vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning; Plegicil vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning). De kan dock användas i enlighet med Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter (se respektive SPC för fullständig information).

Utskriven: 2011-10-10 09:32:46

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Adequanin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Adequanin vet., 250 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Advocin 180, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g oralt pulver										
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin										
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion. Skall ej användas inom 14 dagar före ägglägningens början.	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Ampivet vet., 500 mg tablett	Slakt	7	7	-	-	7	-	-	-	-	-
Apiguard vet, 12,5 g gel för honungsbin Använd inte produkten under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Baytril vet., 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Benestermycin vet. intramammär salva	Mjölk	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Behandlingstidpunkt mer än 4 veckor före kalvning: 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt 4-1 veckor före kalvning: 30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt mindre än 1 vecka före kalvning: 30 dygn efter kalvning.										
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn										
	Mjök	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn										
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn										
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn											
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-		
BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-		
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bovilis BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Boviseal vet, 2,6 g intramammär suspension mjölkkor vid sinläggning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 1 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 1-8 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 2-4 injektionsvätska, suspension	Mjök	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	11	-	-	-	-	-	-	-
Detonervin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjök	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	7	-	-	-	-
Dexafort vet., 3 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicural vet., 100 mg/ml oral lösning för kycklingar och kalkoner Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Dicural, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och hundar	Slakt	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Dinalgen vet., 150 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Domosedan vet., 7,6 mg/ml munhålegel	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.	Slakt	49	33	-	-	-	-	-	-	-
Droncit vet., 9 % oral gel Skall inte användas till ston vars mjölk används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Duvaxyn IE vet., injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Duvaxyn IE-T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Duvaxyn T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Duvaxyn WNV injektionsvätska, emulsion för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Ecomectin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Får ej ges till lakterande kor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till icke-lakterande mjölkkor inklusive dräktiga mjölkkvigor inom 60 dagar före kalvning. Får ej ges till lakterande tackor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till får som är ämnade för produktion av mjölk för human konsumtion inom 60 dagar före lamning.	Slakt	49	28	42	-	-	-	-	-	-
Ecomectin, 18,7 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-
Econor, 0,5 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Econor, 1 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 10 % oralt pulver för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 10 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 50 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Emdocam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
ENERGAID, pulver till oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engemycin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		vid doser upp till 10 mg/kg kroppsvikt/dygn									
	Slakt	30	8	18	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Enrofloxacin N-vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt	Mjök	84h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterisol Ileitis vet., frystorkat pulver och vätska till oral suspension till svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Resequin vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equiparin vet, 50 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Equiparin vet, 500 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	12h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Eraquell vet., 20 mg tugtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Esbetre vet., 30 % pulver till oral lösning Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
Estrumat vet., 0,25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Ethacilin Comp. vet., 200 mg/ml+200 mg/ml injektionsvätska, suspension Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.	Mjölk	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethacilin vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	-	14	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fenoflox vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intravenös injektion										
	Mjölk	84h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subkutan injektion										
	Slakt	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intramuskulär injektion										
Slakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös injektion											
Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subkutan injektion											
Finadyne vet., 25 mg/g granulat	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension										
	Mjolk	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-
	im									
	Slakt	4	-	-	-	1	-	-	-	-
	iv									
Florselect vet, 300 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk och svin										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	30	18	-	-	-	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 250 mg granulat till häst										
	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-
		Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion								
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nötk och svin										
Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjolk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	22	-	-	7	-	-	-	-
Fyrantel vet, 400 mg/g oral pasta										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gallimune ND IB+EDS+ART, injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gallimune ND+IB+ART, injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Gallimune ND+IB+EDS, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
GastroGard, 370 mg/g oral pasta Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Genestran vet, 75 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar och grisar	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Gleptosil vet., 200 mg Fe3+/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonazon, 1600 mikrog/ml injektionsvätska, lösning till laxfisk av honkön	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Gripovac 3 injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Karenstid avser spädkalv									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn.										
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering en gång per dygn										
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn										
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-		
vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion											
Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn											
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion											
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-		
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-		
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac M. hyo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Isoba vet., 100 % inhalationsånga, vätska Ska ej användas till duvor avsedda för humankonsumtion. Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Isopto-Atropin, 0,5 % ögondroppar, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Isopto-Maxidex, 1 mg/ml ögondroppar, suspension	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Isopto-Plain, 5 mg/ml ögondroppar, lösning	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Ivomec Comp oral pasta häst Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder	Slakt	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning Tackor och getter som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	Slakt	-	-	6	8	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta Får inte användas till ston som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Locatim, oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Loxicom, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Metacam för svin, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Minifom, 100 mg/ml orala droppar, emulsion	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Moxidectin/Triklabendazol Fort Dodge, 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning till får	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-
MS-H Vaccine ögondroppar, suspension		Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Mypravec Suis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Narcoxyl vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-
Slakt		1	-	-	-	1	-	-	-	-
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	71	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutant vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.										
Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Netvax injektionsvätska, emulsion till kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis Marexine CA 126 koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobivac Myxo-RHD frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Porcilis M Hyo injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Parvo vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Poulvac FluFend H5N3 RG injektionsvätska, emulsion för kycklingar och ankor Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Previcox, 8,2 mg/g oral pasta för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Procopen vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur, svin, hästar Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	15	-	-	14	-	-	-	-
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu-Te, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sebacil pour on vet., 75 mg/ml pour-on, lösning	Slakt	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning	Slakt	-	21	28	-	-	-	-	-	-	-
Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.	Mjölk	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Suiseng vet. injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn Aujesky 783+O/W, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Synulox vet., 140 mg/ml + 35 mg/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Systemex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tailan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
Terramycin vet., 20 % oralt pulver	Slakt	10	10	-	-	-	14	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjölk	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tetanusvaccin vet., 27 flockningsenheter/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	7	-	7	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	21	28	28	-	-	-	-	-	-	
ThoroVAX vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Torphasol vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Toxicol vet. injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tribrissen vet., 400 mg/ml+80 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjolk	7	-	7	-	7	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen										
	Mjolk	14	-	14	-	14	-	-	-	-	
	Dosering 2 gånger dagligen										
	Slakt	34	30	34	-	-	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen, intramuskulär injektion										
Slakt	14	-	-	-	14	-	-	-	-		
Dosering 1 gång dagligen, intravenös injektion											
Slakt	68	60	68	-	-	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intramuskulär injektion											
Slakt	28	-	-	-	28	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intravenös injektion											
Trimediazin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen										
Slakt	-	-	-	-	20	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen:											
Twinhip vet., 439 mg/g oral pasta till häst Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	35	21	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning										
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-
Ursoferran vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
VangRab injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vectin vet, 22,75 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	52	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Virbamec, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur Virbamec får ej ges till lakterande kor som producerar mjölk för human konsumtion. Dräktiga kor som skall producera mjölk för human konsumtion får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	60h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrog/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Xylocain, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<= 400 mg									
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	> 400 mg									
ZACTRAN, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.	Slakt	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin	Slakt	-	21	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Ovis injektionsvätska, suspension för får	Mjölk	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zulvac 1+8 Ovis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-

