

Karenstider för veterinärläkemedel

Förteckningen utgör en sammanställning över karenstider för läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur och är baserad på respektive läkemedels godkända produktresumé (SPC). Streck (-) i tabellen, eller om rubrikerna *mjolk* eller *ägg* ej anges för en viss produkt, innebär att det inte finns någon fastställd karenstid för respektive djurslag och livsmedel. I ett antal fall är den angivna karenstiden knuten till vissa förbehåll som anges under respektive karenstid. Förbehåll kan också gälla på produktnivå och anges då under läkemedelsnamnet. Ett fåtal läkemedel godkända för häst saknar fastställd karenstid och finns därmed inte med i förteckningen (Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver, dospåsar; Gentaject vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning; Plegicil vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning). De kan dock användas i enlighet med Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter (se respektive SPC för fullständig information).

Utskriven: 2012-01-20 14:22:51

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Adequanin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Adequanin vet., 250 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Advocin 180, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g oralt pulver										
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin										
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Avipro Marek vet., pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Avipro Thymovac vet. frystorkat pulver för användning i dricksvatten	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Axilur vet., 10 % oral suspension	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 19 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 2,5 % oral suspension	Mjölk	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
Axilur vet., 22 % granulat	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Axilur vet., 4 % oralt pulver										
	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Vid normal dos, 5 mg/kg.									
	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Vid ökad dos, 25 mg/kg.									
Banminth vet., 44 % oral pasta										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Banminth vet., 77 % oralt pulver										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Baycox Bovis vet., 50 mg/ml oral suspension										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Baycox Ovine vet., 50 mg/ml oral suspension										
Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	42	-	-	-	-	-	-
Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension till svin										
	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-	-
Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns										
	Slakt	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	Efter andra behandlingen.									
	Ägg	-	-	-	-	-	12h	-	-	-
	Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bayticol vet., 10 mg/ml pour-on, lösning Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	10	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Benestermycin vet. intramammär salva	Mjölk	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn									
	Mjölk	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn									
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn									
	Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn									
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn									
	Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-
		Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn									
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-	-	-
BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Boviseal vet, 2,6 g intramammär suspension mjölkkor vid sinläggning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR ALSap 1 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
BTVPUR ALSap 1-8 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Cosecure vet. intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get	Mjök	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Cronyxin vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1 dygn efter intravenös injektion									
	Slakt	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		7 dygn efter intramuskulär injektion									
Cyclix, 250 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel Skall ej ges till lakterande ston vars mjök används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
Cydectin vet, 18,92 mg/g oral gel för häst	Slakt	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Cydectin vet., 1 mg/ml oral lösning Gäller endast får. Övriga djurslag som producerar mjölk för human konsumtion eller är i sinperiod får ej behandlas.	Mjök	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
Dectomax pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Skall ej ges till lakterande kor, som producerar mjölk för humankonsumtion eller till sinkor eller dräktiga kvigor i mjölkproducerande besättningar närmare kalvning än 60 dygn.	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Dectomax Suis vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	56	-	-	-	-	-	-	-
Dectomax vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Sinkor och kvigor i mjölkproducerande besättningar skall ej behandlas närmare kalvning än 60 dygn. Tackor som producerar mjölk för livsmedelsproduktion, skall ej behandlas i laktationsfas men kan behandlas fram till 70 dygn före lammning.	Slakt	49	-	70	-	-	42	-	-	-
Denagard vet., 125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dicural vet., 100 mg/ml oral lösning för kycklingar och kalkoner Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Dicural, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och hundar	Slakt	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjolk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Dinalgen vet, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinalgen vet, 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin	Slakt	24h	24h	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinalgen vet, 60 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Domosedan vet., 7,6 mg/ml munhålelge	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	49	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.											
Droncit vet., 9 % oral gel	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Skall inte användas till ston vars mjölk används för human konsumtion.											
Duvaxyn IE vet., injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Duvaxyn IE-T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Emdocam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	
ENERGAID, pulver till oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Engemycin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	
	Mjölk	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
		vid doser upp till 10 mg/kg kroppsvikt/dygn									
	Slakt	30	8	18	-	-	-	-	-	-	
Enrofloxacin N-vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt	Mjölk	84 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterisol Ileitis vet., frystorkat pulver och vätska till oral suspension till svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equilis Resequin vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfå	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equiparin vet, 50 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equiparin vet, 500 IE/g gel för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	12h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Eraquell vet., 20 mg tugtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Esbetre vet., 30 % pulver till oral lösning Ej till fjäderfå som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Fenoflox vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk och svin	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intravenös injektion										
	Mjölk	84h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subkutan injektion										
	Slakt	-	10	-	-	-	-	-	-	-	
Intramuskulär injektion											
Slakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
Intravenös injektion											
Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subkutan injektion											
Finadyne vet., 25 mg/g granulat	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-		
	Intravenös injektion										
Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-		
Intravenös injektion											
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Intravenös injektion										
	Slakt	-	18	-	-	-	-	-	-		
	Intravenös injektion										
Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-		
in											
Slakt	4	-	-	-	1	-	-	-	-		
iv											

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Florselect vet, 300 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk och svin Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	30	18	-	-	-	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 250 mg granulat till häst	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion										
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nötk och svin Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	22	-	-	7	-	-	-	-
Fyrantel vet, 400 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gallimune ND IB+EDS+ART, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gallimune ND+IB+ART, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gallimune ND+IB+EDS, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
GastroGard, 370 mg/g oral pasta Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-	-
Genestran vet, 75 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar och grisar	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Gleptosil vet., 200 mg Fe ³⁺ /ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Gonazon, 1600 mikrog/ml injektionsvätska, lösning till laxfisk av honkön	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karenstid avser spädkalv									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Inflacam, 15 mg/ml oral suspension för hästar Ej tillåtet för användning till digivande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Inflacam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och hästar Får ej användas för hästar som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac M. hyo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Isoba vet., 100 % inhalationsånga, vätska Ska ej användas till duvor avsedda för humankonsumtion. Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Isopto-Atropin, 0,5 % ögondroppar, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
MELOXIDYL, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Metacam för häst, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Metacam för svin, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Minifom, 100 mg/ml orala droppar, emulsion	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-	-
Moxidectin/Triklabendazol Fort Dodge, 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning till får	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
MS-H Vaccine ögondroppar, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Mypravac Suis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Narcoxyl vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutant vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.											
Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Netvax injektionsvätska, emulsion till kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis Marexine CA 126 koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Nobivac Myxo-RHD frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjolk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	28	-	-	-
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta Ivermektin skall ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspension för användning i dricksvatten	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Paracox-5 vet., koncentrat till oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Penovet vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	6	-	6	6	6	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	14	14	-	-	-	-
Pirsue, 5 mg/ml intramammär lösning	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Porcilis Ery vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis M Hyo injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Parvo vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Poulvac FluFend H5N3 RG injektionsvätska, emulsion för kycklingar och ankor Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Previcox, 8,2 mg/g oral pasta för hästar Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Procapen vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur, svin, hästar Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	15	-	-	14	-	-	-	-
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Rifen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Rimadyl Bovis vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rintal vet., 10 % granulat för svin, häst, nöt och får	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök vid dosen 10 mg/kg	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök vid dosen 5 mg/kg	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	Slakt vid dosen 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt vid dosen 20 mg/kg	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt vid dosen 5 mg/kg	-	6	14	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Rintal vet., 10 % oral suspension för nöt, får och häst	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök vid dosen 10 mg/kg	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	Mjök vid dosen 5 mg/kg	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	21	-	-	-	-
	Slakt vid dosen 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	-	-	-
	Slakt vid dosen 5 mg/kg	-	-	14	-	-	-	-	-	-
Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-
Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Sebacil pour on vet., 75 mg/ml pour-on, lösning	Slakt	-	16	-	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning	Slakt	-	21	28	-	-	-	-	-	-
Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Siccalactin vet. intramammär salva	Mjölk	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leverans av mjölk får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller längre tid före kalvning. Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 veckor före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning. Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare tid före kalvning.									
Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Socatyl vet., 500 mg oral/kutan pasta	Mjölk	3	-	3	3	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	7	7	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tribrissen vet., 400 mg/ml+80 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	7	-	7	-	7	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen										
	Mjök	14	-	14	-	14	-	-	-	-	
	Dosering 2 gånger dagligen										
	Slakt	34	30	34	-	-	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen, intramuskulär injektion										
Slakt	14	-	-	-	14	-	-	-	-		
Dosering 1 gång dagligen, intravenös injektion											
Slakt	68	60	68	-	-	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intramuskulär injektion											
Slakt	28	-	-	-	28	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intravenös injektion											
Trimediazin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen										
Slakt	-	-	-	-	20	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen:											
Twinhip vet., 439 mg/g oral pasta till häst Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	35	21	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-
Uniferon, 100 mg fe 3+/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Uniferon, 200 mg fe3+/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Ursoferran vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
VangRab injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Vectin vet, 22,75 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 25 mikrog/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Verminator, 100 mg/g oral emulsion för svin och kyckling	Slakt	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
	Slakt	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:										
	Slakt	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
	Slakt	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Vetflurane, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska för hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar Produkten ska inte användas för behandling av ston som producerar mjölk för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Virbamec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
Virbamec, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur Virbamec får ej ges till lakterande kor som producerar mjölk för human konsumtion. Dräktiga kor som skall producera mjölk för human konsumtion får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	60h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrog/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<= 400 mg									
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	> 400 mg									
Xylocain, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<= 400 mg									
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	> 400 mg									
Xylocain, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<= 400 mg									
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	> 400 mg									
ZACTRAN, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.	Slakt	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin										
	Slakt	-	21	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-

