



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä</b> Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion. Skall ej användas inom 14 dagar före ägglägningens början.	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
<b>Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin</b>	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver</b>	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder</b>	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter</b>	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Ampivet vet., 500 mg tablett</b>	Slakt	7	7	-	-	7	-	-	-	-	-
<b>Apiguard vet, 12,5 g gel för honungsbin</b> Använd inte produkten under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
<b>Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Banminth vet., 44 % oral pasta</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Banminth vet., 77 % oralt pulver</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Baycox Bovis vet., 50 mg/ml oral suspension</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension till svin</b>	<b>Slakt</b>	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		Efter andra behandlingen.									
	<b>Ägg</b>	-	-	-	-	-	12h	-	-	-	-
		Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.									
<b>Baytical vet., 10 mg/ml pour-on, lösning</b> Baytical vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.	<b>Mjölk</b>	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-
<b>Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjölk</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Baytril vet., 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Benestermycin vet. intramammär salva</b>	<b>Mjök</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Behandlingstidpunkt mer än 4 veckor före kalvning: 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt 4-1 veckor före kalvning: 30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt mindre än 1 vecka före kalvning: 30 dygn efter kalvning.									
	<b>Slakt</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Beviplex vet., injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-
<b>Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	<b>Slakt</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	-	-	-	<b>28</b>	-	-	-
<b>Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>14</b>	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn										
	<b>Mjök</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn										
	<b>Slakt</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn										
<b>Slakt</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
<b>Slakt</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	-	-	-	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn											
<b>Slakt</b>	<b>20</b>	-	-	-	<b>20</b>	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
<b>Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>	<b>Mjök</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Slakt</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-		
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-		
<b>Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bovilis BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Boviseal vet, 2,6 g intramammär suspension mjölkkor vid sinläggning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 1 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 1-8 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 2-4 injektionsvätska, suspension	Mjök	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt</b>	Mjolk	12h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
<b>Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Compagel vet. gel för häst</b> Skall ej ges till dräktiga eller lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Coopermec Vet., 5 mg/ml pour-on, lösning</b> Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	31	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cosecure vet. intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning</b>	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get</b>	Slakt	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Cronyxin vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjolk</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
										1 dygn efter intravenös injektion
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>7</b>	-	-	-	-
										7 dygn efter intramuskulär injektion
<b>Cyclix, 250 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjolk</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel</b> Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>64</b>	-	-	-	-
<b>Cydectin vet, 18,92 mg/g oral gel för häst</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>32</b>	-	-	-	-
<b>Cydectin vet., 1 mg/ml oral lösning</b> Gäller endast får. Övriga djurslag som producerar mjölk för human konsumtion eller är i sinperiod får ej behandlas.	<b>Mjolk</b>	-	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	<b>14</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Dectomax pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning</b> Skall ej ges till lakterande kor, som producerar mjölk för humankonsumtion eller till sinkor eller dräktiga kvigor i mjölkproducerande besättningar närmare kalvning än 60 dygn.	<b>Slakt</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dectomax Suis vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>56</b>	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)											
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin		
<b>Dectomax vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Sinkor och kvigor i mjölkproducerande besättningar skall ej behandlas närmare kalvning än 60 dygn. Tackor som producerar mjölk för livsmedelsproduktion, skall ej behandlas i laktationsfas men kan behandlas fram till 70 dygn före lammning.	<b>Slakt</b>	<b>49</b>	-	<b>70</b>	-	-	-	<b>42</b>	-	-	-	
	<b>Denagard vet., 125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Denagard vet., 20 mg/g premix till medicinfoder</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	
	<b>Slakt</b>	-	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Förebyggande (vid 2,0 mg/kg kroppsvikt): 1 dag Behandling (vid 5 -10 mg/kg kroppsvikt): 6 dagar	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-
	Hönor Slakt: 1 dag	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-
	Kalkoner Slakt: 4 dagar	<b>Ägg</b>	-	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-
Karens ägg 0 dagar avser hönor												
<b>Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Detonervin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt</b>	<b>Mjök</b>	<b>12h</b>	-	-	-	<b>12h</b>	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjolk	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	7	-	-	-	-	-
<b>Dexafort vet., 3 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>	Mjolk	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dicural vet., 100 mg/ml oral lösning för kycklingar och kalkoner</b> Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Dicural, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och hundar</b>	Slakt	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett</b> Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjolk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dinalgen vet, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjolk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt</b>										
	<b>Mjolk</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Mjolk</b>	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	2	-	-	-	2	-	-	-	-
<b>Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Mjolk</b>	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	0	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Domosedan vet., 7,6 mg/ml munhålelge</b>										
	<b>Mjolk</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.	<b>Slakt</b>	49	33	-	-	-	-	-	-	-
<b>Droncit vet., 9 % oral gel</b>										
Skall inte användas till ston vars mjölk används för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Duvaxyn IE vet., injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Duvaxyn IE-T vet., injektionsvätska, suspension</b>										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>ENERGAID, pulver till oral lösning</b>	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Engemycin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Mjök</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	
		vid doser upp till 10 mg/kg kroppsvikt/dygn									
	<b>Slakt</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Enrofloxacin N-vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt</b>	<b>Mjök</b>	<b>84h</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	<b>14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Enterisol Ileitis vet., frystorkat pulver och vätska till oral suspension till svin</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>14</b>	-	-	-	-	
<b>Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar</b>	<b>Mjök</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar</b>										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Equilis Resequin vet., injektionsvätska, suspension</b>										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst</b>										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar</b>										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Equimax vet oral gel för häst</b> Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
<b>Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tuggtablett för häst</b> Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
<b>EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
<b>EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
<b>Equip F vet., injektionsvätska, suspension</b>										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Equip FT vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equip T vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equiparin vet, 50 IE/g gel för hästar</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equiparin vet, 500 IE/g gel för hästar</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst</b>	Mjölk	-	-	-	-	12h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta</b> Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
<b>Eraquell vet., 20 mg tugtablett för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
<b>Esbetre vet., 30 % pulver till oral lösning</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
<b>Estrumat vet., 0,25 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Finadyne vet., 25 mg/g granulat	Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt im	7	-	-	-	7	-	-	-	-
	Slakt iv	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 250 mg granulat till häst	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-
	Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för human konsumtion									
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nöt och svin Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjök för humankonsumtion.	Mjök	36h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	22	-	-	7	-	-	-	-
Fyrantel vet, 400 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gallimune ND IB+EDS+ART, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Gallimune ND+IB+EDS, injektionsvätska, emulsion</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>GastroGard, 370 mg/g oral pasta</b> Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-
<b>Genestran vet., 75 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar och grisar</b>	<b>Mjök</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Gleptosil vet., 200 mg Fe<sup>3+</sup>/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gonazon, 1600 mikrog/ml injektionsvätska, lösning till laxfisk av honkön</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
<b>Gripovac 3 injektionsvätska, suspension för svin</b>	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar</b>	<b>Slakt</b>	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Karenstid avser spädkalv									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	<b>Mjolk</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn.										
	<b>Mjolk</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering en gång per dygn										
	<b>Slakt</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn										
<b>Slakt</b>	<b>20</b>	-	-	-	<b>20</b>	-	-	-	-		
vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion											
<b>Slakt</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn											
<b>Slakt</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion											
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-		
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	<b>Mjolk</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	<b>Mjolk</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingelvac M. hyo vet., injektionsvätska, emulsion</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Isoba vet., 100 % inhalationsånga, vätska</b> Ska ej användas till duvor avsedda för humankonsumtion. Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska</b>	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>Isopto-Atropin, 0,5 % ögondroppar, lösning</b>	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Isopto-Maxidex, 1 mg/ml ögondroppar, suspension</b>	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Isopto-Plain ögondroppar, lösning</b>	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Ivomec Comp oral pasta häst</b> Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-





Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nött	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Minifom, 100 mg/ml orala droppar, emulsion	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Moxidectin/Triklabendazol Fort Dodge, 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning till får	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
MS-H vaccine ögondroppar, suspension	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mypravac Suis injektionsvätska, suspension	Mjolk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Narcoxyl vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	71	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutan vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Netvax injektionsvätska, emulsion till kycklingar</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis Marexine CA 126 koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Novem för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Paracox-5 vet., koncentrat till oral suspension</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
<b>Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
<b>Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjolk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
<b>Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penovet vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>	Mjolk	6	-	6	6	6	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	14	14	-	-	-	-
<b>Pigeron vet., 100 mg fe 3+/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-
<b>Pigeron vet., 200 mg fe3+/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Pirsue, 5 mg/ml intramammär lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis M Hyo injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Parvo vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Poulvac Flufend H5N3 RG injektionsvätska, emulsion</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Previcox, 8,2 mg/g oral pasta för hästar</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
<b>Procapen vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur, svin, hästar</b> Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	15	-	-	14	-	-	-	-	-
<b>Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>ProteqFlu injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>ProteqFlu injektionsvätska, suspension för häst</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension för häst</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>ProteqFlu-Te, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder</b>	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-
<b>Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension</b>	Mjölk	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-
<b>Rapidexon vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	11	-	-	-	-
<b>Receptal vet., 4,2 mikrog/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>RESPIPORC FLU3 injektionsvätska, suspension för svin</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rheumocam, 15 mg/ml oral suspension för häst</b>	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
<b>Rheumocam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>RHINISENG injektionsvätska, suspension</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rifen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-
<b>Rimadyl Bovis vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rintal vet., 10 % granulat för svin, häst, nöt och får</b>	<b>Mjök</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mjök</b> vid dosen 10 mg/kg	-	-	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Mjök</b> vid dosen 5 mg/kg	-	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>21</b>	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> vid dosen 10 mg/kg	-	-	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> vid dosen 20 mg/kg	-	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> vid dosen 5 mg/kg	-	<b>6</b>	<b>14</b>	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Rintal vet., 10 % oral suspension för nöt, får och häst</b>	<b>Mjök</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mjök</b>	-	-	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-
	vid dosen 10 mg/kg									
	<b>Mjök</b>	-	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-
	vid dosen 5 mg/kg									
	<b>Slakt</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>21</b>	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-
	vid dosen 10 mg/kg									
	<b>Slakt</b>	-	-	<b>14</b>	-	-	-	-	-	-
	vid dosen 5 mg/kg									
<b>Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-
<b>Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
<b>Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur</b>	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ruvax vet., injektionsvätska, suspension</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Sebacil pour on vet., 75 mg/ml pour-on, lösning</b>	<b>Slakt</b>	-	16	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning</b>	<b>Slakt</b>	-	21	28	-	-	-	-	-	-
<b>Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	10	-	-	-	-
<b>Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat</b>	<b>Mjölk</b>	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	0	0	0	-	0	-	-	-	-
<b>Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjölk</b>	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	2	2	2	-	-	-	-	-	-
<b>Siccalactin vet. intramammär salva</b>	<b>Mjölk</b>	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	35	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Socatyl vet., 500 mg oral/kutan pasta</b>	<b>Mjölk</b>	3	-	3	3	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	7	7	7	7	7	-	-	-	-





Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tribrissen vet., 400 mg/ml+80 mg/ml injektionsvätska, suspension	<b>Mjolk</b>	7	-	7	-	7	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen										
	<b>Mjolk</b>	14	-	14	-	14	-	-	-	-	
	Dosering 2 gånger dagligen										
	<b>Slakt</b>	34	30	34	-	-	-	-	-	-	
	Dosering 1 gång dagligen, intramuskulär injektion										
<b>Slakt</b>	14	-	-	-	14	-	-	-	-		
Dosering 1 gång dagligen, intravenös injektion											
<b>Slakt</b>	68	60	68	-	-	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intramuskulär injektion											
<b>Slakt</b>	28	-	-	-	28	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen, intravenös injektion											
Trimediazin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	10	-	-	-		
	Dosering 1 gång dagligen										
<b>Slakt</b>	-	-	-	-	20	-	-	-	-		
Dosering 2 gånger dagligen:											
Twinhip vet., 439 mg/g oral pasta till häst Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-		
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-		
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Mjölk</b>	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	35	21	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning</b> Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	1	-	-	-	2	-	-	-
<b>Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Mjölk</b>	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	28	28	28	-	28	-	-	-	-
<b>Ursoferran vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension</b>	<b>Slakt</b>	-	-	14	-	-	-	-	-	-
<b>VangRab injektionsvätska, suspension</b>										
	<b>Mjölk</b>	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	0	-	-	-
<b>Vectin vet, 22,75 mg tuggtablett för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	52	-	-	-	-
<b>Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	28	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Virbamec, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur</b> Virbamec får ej ges till lakterande kor som producerar mjölk för human konsumtion. Dräktiga kor som skall producera mjölk för human konsumtion får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	<b>Slakt</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>	<b>Mjölk</b>	<b>60h</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	-	<b>42</b>	-	-	-	-	-
<b>Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrog/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Slakt</b> <= 400 mg	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> > 400 mg	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
<b>Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-
<b>Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Slakt</b> <= 400 mg	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> > 400 mg	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
<b>Xylocain, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Slakt</b> <= 400 mg	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> > 400 mg	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
ZUPREVO, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin										
	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-