

Förteckningen utgör en sammanställning över karenstider för läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur och är baserad på respektive läkemedels godkända produktresumé (SPC). Förteckningen uppdateras varje månad. Streck (-) i tabellen, eller om rubrikerna *mjolk* eller *ägg* ej anges för en viss produkt, innebär att det inte finns någon fastställd karenstid för respektive djurslag och livsmedel. I ett antal fall är den angivna karenstiden knuten till vissa förbehåll som anges som fotnoter. Om karenstiderna är olika beroende på dos eller administreringsväg anges här den längsta karenstiden; exempelvis kan en lägre dos ha en kortare karenstid (se SPC). Ett fåtal läkemedel godkända för häst saknar fastställd karenstid och finns därmed inte med i förteckningen (Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver, dospåsar; Gentaject vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning; Myolaxin vet. 150 mg/ml infusionsvätska, lösning). De kan dock användas i enlighet med Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter (se respektive SPC för fullständig information).

Utskriven: 2009-06-12 13:38:17

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
A.E. Vaccin Nobilis vet., pulver till oral lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Adequanin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Adequanin vet., 250 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Advocin 180, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-
Ampivet vet., 500 mg tablett	Slakt	7	7	-	-	7	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Avipro Marek vet, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning(#)	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Axilur vet., 10 % oral suspension	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-
Axilur vet., 19 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-
Axilur vet., 2,5 % oral suspension	Mjölk	-	-	6	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-
Axilur vet., 22 % granulat	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-
Axilur vet., 4 % oralt pulver(*)	Slakt	-	14	-	-	-	-	-	-
Banminth vet., 44 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Banminth vet., 77 % oralt pulver	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Baycox Bovis vet., 50 mg/ml oral suspension(⊘)	Slakt	63	-	-	-	-	-	-	-
Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension till svin	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-
Bayticol vet., 10 mg/ml pour-on, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	10	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten(#)	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-
	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	10	10	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-
Benestermycin vet. intramammär salva(§)	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-

(⊘) Ej tillåtet till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(§) Karenstid: Mjölk: Behandlingstidpunkt mer än 4 veckor före kalvning: 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt 4-1 veckor före kalvning: 30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning. Behandlingstidpunkt mindre än 1 vecka före kalvning: 30 dygn efter kalvning.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)	Slakt	35	28	-	-	-	-	28	-
Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	48	42	-	-	20	-	-	-
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-
Bovikalc vet., 43 g intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension		Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Boviseal vet, 2,6 g intramammarium, sintidsbehandling		Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AISap 8 injektionsvätska, suspension		Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-
Butador vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Calphon vet., injektionsvätska, lösning		Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Carepen vet., 600 mg intramammär suspension till lakterande ko		Mjök	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt(Φ)		Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-

(Φ) Karenstid mjök: 12 timmar

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-
Cosecure vet. intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-
Cronyxin vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)	Mjolk	1	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-
Cyclix, 250 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-
Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel(λ)	Slakt	-	-	-	-	64	-	-	-
Cydectin vet, 18,92 mg/g oral gel för häst	Slakt	-	-	-	-	32	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Cydectin vet., 1 mg/ml oral lösning(δ)									
	Mjölk	-	-	5	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-
Dectomax pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning(¥)									
	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-
Dectomax Suis vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning									
	Slakt	-	56	-	-	-	-	-	-
Dectomax vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(*) (¥)(β)									
	Slakt	49	-	70	-	-	-	42	-
Denagard vet., 125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten									
	Slakt	-	10	-	-	-	-	-	-
Denagard vet., 2 % premix till medicinfoder									
	Slakt	-	10	-	-	-	-	-	-
Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning									
	Slakt	-	28	-	-	-	-	-	-
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning									
	Mjölk	3	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	7	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(β) Tackor som producerar mjölk för livsmedelsproduktion, skall ej behandlas i laktationsfas men kan behandlas fram till 70 dygn före lammning.

(δ) Gäller endast får. Övriga djurslag som producerar mjölk för human konsumtion eller är i sinperiod får ej behandlas.

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Dexafort vet., 3 mg/ml injektionsvätska, suspension		Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicural vet., 100 mg/ml oral lösning för kycklingar och kalkoner(#)		Slakt	-	-	-	-	-	1	-	-
Dicural, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och hundar		Slakt	46	-	-	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett(φ)		Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning		Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst och hund		Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(Φ)		Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(Φ) Karenstid mjölk: 12 timmar

(φ) Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider , H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-
Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)	Slakt	49	33	-	-	-	-	-	-
Droncit vet., 9 % oral gel	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Duvaxyn IE vet., injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Duvaxyn IE-T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Duvaxyn T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Duvaxyn WNV injektionsvätska, emulsion för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Ecomectin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)(Ξ)	Slakt	42	28	42	-	-	-	-	-
Ecomectin, 18,7 mg/g oral pasta för häst(λ)	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-
Econor, 0,5 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

(Ξ) Får ej ges till lakterande tackor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till får som är ämnade för produktion av mjölk för human konsumtion inom 60 dagar före lamning.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Econor, 1 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-
Econor, 10 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-
Econor, 50 % premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-
ENERGAID, pulver till oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-
Engemycin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)	Mjolk	7	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	14	21	-	-	-	-	-
Enterisol Ileitis vet., frystorkat pulver och vätska till oral suspension till svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-
Equiffa vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Equilis Resequin vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst(λ)	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst(λ)	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta(λ)	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-
Esbetre vet., 30 % pulver till oral lösning(#)	Slakt	-	-	-	-	-	16	-	-
Estrumat vet., 0,25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Ethacilin Comp. vet., 200 mg/ml+200 mg/ml injektionsvätska, suspension(ε)		Mjök	12	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Ethacilin vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension		Mjök	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	-	14	-	-	-	-
Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning		Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Finadyne vet., 25 mg/g granulat		Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	7	-	-	-	-
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension(*)		Mjök	1	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	18	-	-	7	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning(λ)		Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	-	-	-	28	-	-	-	-
Fyrantel vet, 40 % oral pasta		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjök används för human konsumtion.

(ε) Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Gallimune ND IB+EDS+ART, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Gallimune ND+IB+ART, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Gallimune ND+IB+EDS, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
GastroGard, 370 mg/g oral pasta(λ)	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-
Geepenil vet. pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjolk	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-
Gonazon, 1600 mikrog/ml injektionsvätska, lösning till laxfisk av honkön	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	0
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar(u)	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	48	42	-	-	20	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

Karenstid avser spädkalv

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta(*)	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin, 17 mikrog (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-
Hiprasuis-P/E, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Hylartil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Hyoresp, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Ibraxion, injektionsvätska, emulsion	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Ingelvac M. hyo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Insol Dermatophyton vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Isoba vet., 100 % inhalationsånga, vätska(λ)	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-
IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-
Isopto-Atropin, 0,5 % ögondroppar, lösning	Mjolk	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-
Isopto-Maxidex, 1 mg/ml ögondroppar, suspension	Mjolk	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-
Isopto-Plain ögondroppar, lösning	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Ivomec Comp oral pasta häst	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning(¥)	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder	Slakt	-	12	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning(⌘)	Slakt	-	-	28	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)	Slakt	35	28	-	-	-	-	28	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta(λ)	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-
Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-
Locatim, oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-
Mamyzin vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

(⌘) Tackor som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Marexine vet. pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-
Medicinal Oxygen Air Liquide Santé, 100% medicinsk gas, komprimerad	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-
Metacam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-
Minifom, 100 mg/ml orala droppar, emulsion	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-
Mypravac Suis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Narcoxyl vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning		Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin		Slakt	-	71	-	-	-	-	-	
Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension		Slakt	-	0	-	-	-	-	-	
Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion(#)		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	
Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion(Ω)		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	
Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling(#)		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	
Nobilis Influenza H7N1 injektionsvätska, emulsion		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(Ω) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion. Kan ges upp till 4 veckor före värping

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering(Ω)	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion(#)	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension(#)	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-
Nobivac Rabies vet., injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning(¥)	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning(Ξ)	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)	Slakt	35	28	-	-	-	-	28	-

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(Ξ) Får ej ges till lakterande tackor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till får som är ämnade för produktion av mjölk för human konsumtion inom 60 dagar före lamning.

(Ω) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion. Kan ges upp till 4 veckor före värping

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta(λ)	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-
Opticorten vet., 5 mg tablett	Mjölk	3	-	-	-	3	-	-	-
	Slakt	35	28	-	-	35	-	-	-
Paracox-5 vet., koncentrat till oral suspension(#)	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten(#)	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Penovet vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	6	6	6	-	-	-
	Slakt	14	14	14	14	14	-	-	-
Pigeron vet., 100 mg fe 3+/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Pirsue, 5 mg/ml intramammär lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	23	-	-	-	-	-	-	-
Plegicil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	90	-	-	-
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Porcilis M Hyo injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Parvo vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli, injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Poulvac Flufend H5N3 RG injektionsvätska, emulsion(#)	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Previcox, 8,2 mg/g oral pasta för hästar	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
ProteqFlu-Te, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Provid, 44 % oral pasta(λ)	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst(λ)	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-
Qualimec, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)(Ξ)	Slakt	42	28	42	-	-	-	-	-
Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension	Mjolk	0	-	0	-	0	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-
Rapidexon vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	3	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	2	-	-	11	-	-	-

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

(Ξ) Får ej ges till lakterande tackor som producerar mjölk för human konsumtion. Får ej ges till får som är ämnade för produktion av mjölk för human konsumtion inom 60 dagar före lamning.

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Receptal vet., 4,2 mikrog/ml injektionsvätska, lösning		Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	
Rifen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning		Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	
Rimadyl Bovis vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning		Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	
Rintal vet., 10 % granulat för svin, häst, nöt och får(*)		Mjök	5	-	7	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	21	-	21	-	-	-	
Rintal vet., 10 % oral suspension för nöt, får och häst(*)		Mjök	5	-	7	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	21	-	21	-	-	-	
Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning		Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	
Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning		Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	2	-	1	-	-	-	

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur		Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruvax vet., injektionsvätska, suspension		Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Sebacil pour on vet., 75 mg/ml pour-on, lösning		Slakt	-	16	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning		Slakt	-	21	28	-	-	-	-	-
Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning		Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-
Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat		Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning		Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Siccalactin vet. intramammär salva(Θ)		Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-

(Θ) Leverans av mjölk får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller längre tid före kalvning. Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 veckor före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning. Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare tid före kalvning

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Socatyf vet., 500 mg oral/kutan pasta		Mjök	3	-	3	3	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	7	7	-	-	-	
Spiramycin vet., 260 000 IE/ml injektionsvätska, lösning		Mjök	8	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	
Stellamune One vet., injektionsvätska, emulsion		Slakt	-	0	-	-	-	-	-	
Streptocillin vet., 200 mg/200 mg intramammär salva		Mjök	6	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	
Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension		Mjök	12	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	60	60	60	-	-	-	-	-	
Suvaxyn Aujeszky 783+O/W, injektionsvätska, emulsion		Slakt	-	0	-	-	-	-	-	
Synulox vet., 140 mg/ml + 35 mg/ml injektionsvätska, suspension		Slakt	-	31	-	-	-	-	-	

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Systamex Repidose vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning(Æ)	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-
Terramycin vet., 20 % oralt pulver	Slakt	10	10	-	-	-	14	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	7	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjolk	2	-	2	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-
Tetanusvaccin vet., 27 flockningsenheter/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	7	-	7	-	-	-	-	-
	Slakt	21	28	28	-	-	-	-	-
Tokosel vet., 20 mg/g+0,4 mg/g oralt pulver	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	0	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-

(Æ) Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas. Karenstidsförsäkring ingår

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Toxicol vet. injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Tribrissen vet. injektionsvätska, suspension(*)	Mjölk	14	-	14	-	14	-	-	-
	Slakt	68	60	68	-	28	-	-	-
Tribrissen vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta till häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-
Trimediazin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver(*)	Slakt	-	-	-	-	20	-	-	-
Twinhip Vet., 439 mg/g oral pasta(λ)	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	35	21	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning(#)	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

(λ) Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Ultraplex vet. injektionsvätska, lösning		Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	-	-	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning		Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-
Ursoferran vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning		Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension		Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-
VangRab injektionsvätska, suspension		Mjolk	0	-	0	0	0	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension(#)		Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrog/g granulat		Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-
Ventipulmin vet., 25 mikrog/ml oral lösning		Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-

(#) Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion

Preparat		Karenstid (dygn)								
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	
Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)		Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	15	-	-	21	-	-	-	
Virbamec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(¥)		Slakt	35	28	-	-	-	-	28	-
Virbamec, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur(¥)		Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension		Mjölk	3	-	-	-	3	-	-	-
	Slakt	35	28	-	-	35	-	-	-	
Xento vet., injektionsvätska, suspension		Slakt	-	0	0	-	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrog/ml injektionsvätska, lösning(*)		Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning		Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-
Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)		Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-
Xylocain, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)		Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

Preparat		Karenstid (dygn)							
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk
Xylocain, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning(*)	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-
ZACTRAN, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk(¥)	Slakt	64	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin	Slakt	-	21	-	-	-	-	-	-

(*) Finns kortare karenstid för viss dosering/administreringsväg

(¥) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.