

Utskriven: 2023-03-01 13:28:47

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Addimag vet, 160 mg/ml + 84 mg/ml infusionsvätska, lösning för nötkreatur										
	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Addimag vet, 240 mg/ml + 126 mg/ml infusionsvätska, lösning för nötkreatur										
	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Adequanin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Adequanin vet., 250 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Advocin 180, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning											
	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
AFTOVAXPUR DOE injektionsvätska, emulsion för får, nöt ,svin											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
Aivlosin för fasan, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fasan ska inte ges inom 14 dagar före äggläggningens början. Kan släppas tidigast två dagar efter avslutad medicinering. Använd inte till fjäderfä som producerar eller är avsedda för produktion av ägg för humankonsumtion											
	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Aivlosin för höns och kalkon, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för kyckling och kalkon Ej godkänt för användning till äggläggande kalkoner som producerar ägg för humankonsumtion. Kalkon: ska inte ges inom 21 dagar före äggläggningens början. Fasan: ska inte ges inom 14 dagar före äggläggningens början. Kan släppas tidigast två dagar efter avslutad medicinering.											
	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Aivlosin för svin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin											
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g oralt pulver för svin											
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin											
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Apivar vet, 500 mg bikupestrip för honungsbin										
Använd inte under honungsdrag. Skörda inte honung från yngelrummet. Skörda inte honung när behandlingen pågår. Yngelramar bör bytas ut mot nya mellanväggar minst var tredje år. Yngelramar skall inte återanvändas som honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Aqualec, 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt										
	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	0 <i>h</i>	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Arti-Cell Forte, 1,4-2,5 miljoner celler injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Aservo EquiHaler, 343 mikrogram/puff inhalationsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	18	-	-	-	-
Attane vet, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska										
Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	2	-	-	2	-	-	-	-
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension										
Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Avipro Thymovac vet. frystorkat pulver för användning i dricksvatten										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
		Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Axilur vet., 10 % oral suspension											
	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 19 % oral pasta											
	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 2,5 % oral suspension											
	Mjölk	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
Axilur vet., 22 % granulat											
	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 4 % oralt pulver											
	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid normal dos, 5 mg/kg.										
Axilur vet., 4 % oralt pulver											
	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid ökad dos, 25 mg/kg.										
Banminth vet., 44 % oral pasta											
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Baycox Iron, 36 mg/ml + 182 mg/ml injektionsvätska, suspension											
	Slakt	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Baycoxine vet, 50 mg/ml oral suspension till nöt, svin och får Nöt: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Får: Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	77	42	-	-	-	-	-	-
Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns	Slakt	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	Efter andra behandlingen.									
	Ägg	-	-	-	-	-	12<i>h</i>	-	-	-
	Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.									
Bayticol vet., 10 mg/ml pour-on, lösning Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	10	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	-	3	4	-	-	-	-	-
	Mjölk	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Efter intravenös injektion									
	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Efter subkutan injektion									
	Slakt	-	13	4	6	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Efter intravenös injektion									
	Slakt	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Efter subkutan injektion									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning											
Ska inte användas till fåglar avsedda som livsmedel.	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	6	
Belfer vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar, kor, grisar, får, getter och hundar											
	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-	
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
Benestermycin vet. intramammär salva											
	Mjölk	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid behandling mindre än 35 dagar före kalvning, eller under laktation: 37 dagar efter behandling. Vid behandling 35 dagar eller mer före kalvning: 36 timmar efter kalvning.										
	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-	
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning											
Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	
Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta											
	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn									
	Mjölk	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn									
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn									
	Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn									
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn									
	Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn									
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-	-
Bimprocil vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension nöt, svin , får Ej godkänt för användning till får som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Mjölk	108h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	7	4	-	-	-	-	-	-
Blaze vet., 7,5 mg/ml pour-on, suspension för nöt och får										
	Mjölk	0	-	12h	-	-	-	-	-	-
	Slakt	18	-	1	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovalto injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovalto Respi 2 nässpray, frystorkat pulver och vätska till suspension för nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovela frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovigen RCE vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis Blue-8 injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis Rotavec Corona vet. injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis RSP live vet. nässpray, frystorkat pulver och vätska till suspension för nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellin Aquilon injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	0	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Caremast vet, 600 mg intramammär suspension för lakterande ko	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Carepen vet., 600 mg intramammär suspension till lakterande ko	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Carprosan vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning nöt	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjölk	12h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Cevac Mass L frystorkat pulver till okulonasal suspension till kyckling	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Cevac MD Rispens koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension för kyckling	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Chanaxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning gris, får och nöt	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Chanox vet, 50 mg/ml oral suspension för svin, nötkreatur och får										
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	77	42	-	-	-	-	-	-
Ej godkänt för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.										
CircoMax injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
CircoMax Myco injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Closamectin vet, 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning till nöt										
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperioden. Använd inte till kvigor under andra hälften av dräktighetsperioden om djuren är avsedda för mjölkproduktion för humant bruk.	Slakt	58	-	-	-	-	-	-	-	-
På grund av uppenbar risk för kontaminering med medlet mellan behandlade och obehandlade djur genom slickning, skall alla djur i en grupp behandlas samtidigt och behandlade djur hållas separerade från obehandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det medföra att gränsvärden för läkemedlet överskrids hos obehandlade djur.										
CLYNAV injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Coglapix injektionsvätska, suspension för svin										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Coliprotec F4/F18 frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-
Compagel vet. gel för häst Använd inte till dräktiga eller lakterande djur som ska producera mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Contacera, 15 mg/ml oral suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Contacera, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get	Mjölk	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Cronyxin vet, 50 mg/g oral pasta för häst Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Cronyxin vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1 dygn efter intravenös injektion									
Cryptisel vet, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyclopray vet, 78,6 mg/g kutan spray, suspension för svin, får och nötkreatur Använd inte på juver hos lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	0h	-	0h	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	64	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	32	-	-	-	-
Dalmaprost vet, 0,075 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	0	1	-	-	2	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej godkänt för användning till lakterande häst som producerar mjölk för humankonsumtion	Mjölk	72 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	
Dexaject, 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	72 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	
Dexapid vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	72 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	
Dilaterol vet., 25 mikrogram/ml sirap för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	
Dinalgen vet, 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst Ej tillåtet att använda till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	2	3	-	-	1	-	-	-	-	
Dinolytic vet., 12,5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
Distocur vet., 34 mg/ml oral suspension för nötkreatur och får	Mjölk	108 <i>h</i> 108 timmar motsvarar 4,5 dygn.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mjölk	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
		168 timmar									
	Slakt	13	-	14	-	-	-	-	-	-	
Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	12 <i>h</i>	-	-	-	12 <i>h</i>	-	-	-	-	
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	
Domosedan vet., 7,6 mg/ml munhålegel	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Dophexine, 20 mg/g pulver för användning i dricksvatten/mjölk	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Använd inte till fjäderfä som producerar ägg avsedda för humankonsumtion under och fyra veckor innan värpningsperioden.									
	Slakt	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ej godkänt för användning till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.									
Dormaquin vet, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar										
Läkemedlet är ej godkänt för användning till hästar avsedda för human konsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doxycycline Divasa-Farmavic, 200 mg/ml lösning för användning i dricksvatten										
Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för human konsumtion.										
Skall inte användas inom 4 veckor före ägglägningsperiodens början.										
	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	Efter en dos på 10 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar									
	Slakt	-	-	-	-	-	12	-	-	-
	Efter en dos på 20 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar									
Doxycycline Divasa-Farmavic, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten										
Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.										
Skall inte användas inte inom 4 veckor före ägglägningsperiodens början.										
	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	Efter en dos på 10 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar.									
	Slakt	-	-	-	-	-	12	-	-	-
	Efter en dos på 20 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar.									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Dozuril vet, 50 mg/ml oral suspension för svin										
	Slakt	-	61	-	-	-	-	-	-	-
Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.										
	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-
DRAXXIN, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 10 % oralt pulver för svin										
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 10 % premix till medicinfoder för svin										
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 50 % premix till medicinfoder för svin										
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ECOPORC SHIGA injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ekyflogyl vet, 1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml gel för hästar Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Embotape Vet, 400 mg/g oral pasta										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Emdocam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Enzaprost, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin										
	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Eprecis vet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötkreatur, får och get										
	Mjölk	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-
	Slakt	63	-	42	42	-	-	-	-	-
Eprinex vet., 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur, får och getter										
	Mjölk	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	2	1	-	-	-	-	-
Equibactin vet., 250 mg/g + 50 mg/g oralt pulver för häst										
	Slakt	-	-	-	-	20	-	-	-	-
	Kött och slaktbiprodukter: 20 dygn, Mjölk: Använd inte till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.									
Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension, förfylld spruta										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
EQUIOXX, 57 mg tuggtablett										
	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip WNV injektionsvätska, emulsion för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equipred Vet, 50 mg tablett för häst Ej godkänt för användning på lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Equipulmin vet, 25 mikrogram/ml sirap till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	12 <i>h</i>	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Equishield EHV injektionsvätska, emulsion för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equisolon, 100 mg oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Equisolon, 300 mg oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Equisolon, 33,3 mg/g oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Equisolon, 600 mg oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
	Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.									
Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-
ERAVAC injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ERYSENG injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ERYSENG PARVO injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Estrumat vet., 0,25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Ethacilin Comp. vet., 200 mg/ml+200 mg/ml injektionsvätska, suspension Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.	Mjölk	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ethacilin vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	-	14	-	-	-	-
Euthanimal vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att djurkroppar och ätbara produkter från djur som injicerats med det här läkemedlet inte kommer in i livsmedelskedjan och inte används för humankonsumtion. Andra djur får aldrig äta (delar av) djurkroppen, eftersom detta kan göra att de exponeras för en dödlig pentobarbitaldos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euthanimal vet, 400 mg/ml injektionsvätska, lösning Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att djurkroppar och ätbara produkter från djur som injicerats med det här läkemedlet inte kommer in i livsmedelskedjan och inte används för humankonsumtion. Andra djur får aldrig äta (delar av) djurkroppen, eftersom detta kan göra att de exponeras för en dödlig pentobarbitaldos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euthasol vet., 400 mg/ml injektionsvätska, lösning Tillräckliga åtgärder ska vidtas för att se till att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euthoxin vet, 500 mg/ml injektionsvätska, lösning Använd inte till djur som är avsedda att konsumeras av människor eller djur. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att djurkadaver behandlade med detta läkemedel och biprodukter av dessa djur inte går in i näringskedjan och inte används för human- eller djurkonsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evalon suspension och vätska till oral spray										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

[illegible]

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ferglep vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Filavac VHD K C+V injektionsvätska, suspension för kaniner	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Finadyne vet, 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur På grund av risk för kontaminering med detta läkemedel till icke-behandlade djur, t ex genom slickande, bör behandlade djur hållas åtskilda från icke-behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till resthalter hos icke-behandlade djur.	Mjölk	36 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt im	7	-	-	-	7	-	-	-	-
	Slakt iv	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Flimabend vet, 100 mg/g suspension för användning i dricksvatten för svin och kyckling	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	1 mg/kg kroppsvikt i 5 dagar.									
	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	2,5 mg/kg kroppsvikt i 2 dagar.									
	Ägg	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Florselect vet, 300 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk och svin										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	30	18	-	-	-	-	-	-	-
Flunipaste Vet., 50 mg/g oral gel										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion	Slakt	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nötk och svin										
Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	36 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	22	-	7	-	-	-	-	-
Flyecto vet, 12,5 mg/ml pour-on, lösning för får										
	Mjölk	-	-	120 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	8	-	-	-	-	-	-
Folliplan vet., 4 mg/ml oral lösning för svin										
	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-
Forceris, 30 mg/ml + 133 mg/ml injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Formic acid NOD, 68,2 g bikupestrip för honungsbin										
Skatthådor med honung måste tas bort från bikupan innan produkten appliceras. Honung som förvaras i skatthåda/skatthådor som satts på under behandlingsperioden måste tas bort och får inte användas för mänsklig konsumtion. Använda läkemedelsremсор måste tas bort innan skatthådor som är avsedda för skörd ställs på bikupan.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Fuxien vet, 1000 mg/g inhalationsånga, lösning										
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Gallivac IB88 brustablett till okulonasal suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Ganutil, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin, häst, får och get	Mjölk	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Gastazole vet, 370 mg/g oral pasta för hästar Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gastrobim vet, 370 mg/g oral pasta för häst Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
GastroGard, 370 mg/g oral pasta Använd inte till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Gentaject vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning Häst: Ej godkänt för användning till hästar som producerar kött eller mjölk för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gleptosil vet., 200 mg Fe3+/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Glucadex Vet, 2 mg/ml injektionsvätska, lösning häst, nötkreatur, get, svin, hund och katt										
Karenstid; häst:	Mjolk	72h	-	-	72h	-	-	-	-	-
Mjolk: Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjolk avsedd för humankonsumtion.	Slakt	8	-	-	8	8	-	-	-	-
	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	efter intramuskulär administrering									
	Slakt	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	efter intravenös administrering									
Glucobel vet, 40g/100 ml infusionsvätska, lösning för häst, nötkreatur, får, get, svin, hund och katt.										
	Mjolk	0h	-	0h	0h	0h	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
GUMBOHATCH frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HALAGON, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar										
	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar										
	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karenstid avser spädkalv									
Hatchpak IB H120 brustablett till okulonasal suspension										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Hemosilate vet, 125 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	-	-	-	-
	Slakt	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	efter IM administration									
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	efter IV administration									
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	vid administrering 2 gånger per dygn.									
	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	vid administrering en gång per dygn									
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn									
	Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion									
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-
	vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn									
	Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-
	vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion									
Hippoazol vet, 400 mg enterogranulat för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Ej godkänt för användning till digivande lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiprabovis somni/Lkt injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin vet., 17 mikrogram (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
HorStem injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
HuveGuard MMAT vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HuveGuard NB vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hyobac App 2 Vet. injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Hyobac App Multi Vet. injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Improvac injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Imrestor, 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Increxxa, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-	
Increxxa, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-	
Inflacam, 15 mg/ml oral suspension för hästar Ej tillåtet för användning till digivande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
Inflacam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och hästar Får ej användas för hästar som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Inflacam, 330 mg granulat	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Inflacam, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. för nötkreatur och svin.	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Infucal vet. infusionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Infusolec infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	0 <i>h</i>	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Inmeva vet injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Innovax-ILT suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Innovax-ND-IBD suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Innovax-ND-ILT koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Isoflutek Vet, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Isothesia vet, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska	Slakt	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Ivomec Comp oral pasta häst Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning Tackor och getter som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	Slakt	-	-	6	8	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	28	-	-	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta Får inte användas till ston som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	14	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Ketabel vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur, får, get, häst, svin, marsvin, hamster, kanin, råtta och mus	Mjolk	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Ketador vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0 <i>h</i>	-	-	-	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ketexx Vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej godkänt för användning hos kaniner för humankonsumtion.	Mjolk	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Ketodolor vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nötkreatur och svin Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjolk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
	Slakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	efter intramuskulär administrering										
	Slakt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
efter intravenös administrering											

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ketosol vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.										
Kexxtone, 32,4 g intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kriptazen, 0,5 mg/ml oral lösning	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Lacosamide STADA, 200 mg filmdragerad tablett	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Lidobel vet., 16 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjölk	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Lidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Locatim, oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gäller nyfödda kalvar som är yngre än 12 timmar.										

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Loxicom, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Loxicom, 50 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
LYDAXX, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-
Maxyl vet, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, kalkoner, ankor och grisar Ej godkänt för användning till fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före äggläggningens början.	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt Ankor	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	Slakt Kalkoner	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	Slakt Kycklingar	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Melovem, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin, och häst	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Melovem, 30 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Melovem, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Meloxidolor, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Meloxidolor, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
MELOXIDYL, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Mepiblock Vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Mepidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst	Mjölk	-	-	-	-	72h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Metacam för häst, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur och häst, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning Not authorised to use in horses producing milk for human consumption.	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	5	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Metacam för svin, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Metaxx Vet, 15 mg/ml oral suspension för häst Ej godkänt för användning till lakterande hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Metaxx Vet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst. Ej godkänt för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	120 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Mhyogen vet. injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
MHYOSPHERE PCV ID injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
MS-H Vaccine ögondroppar, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
MULTIMIN Vet injektionsvätska, lösning	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mypravac Suis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
NASYM frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	71	-	-	-	-	-	-	-	
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutan vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.										
Nematel vet., 439 mg/g oral pasta för häst											
Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Nerfasin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt och häst	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Nerfasin vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt, häst, hund och katt	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Nimatek Vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst	Mjölk	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Nobilis Gumboro Inac. vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

[illegible]

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Nobivac Myxo-RHD PLUS frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-
Noromectin Comp vet., 18,7 mg + 140,3 mg oral pasta för häst Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta Ivermektin skall ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-
Noroseal, 2,6 g intramammär suspension för kor	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Novamune koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension för kyckling										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Novaquin, 15 mg/ml oral suspension för häst										
	Slakt	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Novem för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Novem, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Ophtaclin vet, 10 mg/g ögonsalva för hund, katt och häst										
	Slakt	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion									
Osphos, 51 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Parvoerybac injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Pecopro vet, 40 mg/g + 40 mg/g gel för nötkreatur	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Penethaone vet, 236,3 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	60 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Peniyet vet, 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur, grisar och får	Mjölk	96 <i>h</i>	-	156 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-
	Slakt	6	6	4	-	-	-	-	-	-
Penovet vet., 300 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	6	-	6	6	6	-	-	-	-
	Slakt	14	14	14	14	14	-	-	-	-

[illegible]

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Permacyl, 236,3 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	60 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pirsue, 5 mg/ml intramammär lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plegicil vet, 35 mg/ml oral gel för häst	Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.										
Plegicil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.										
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Porcilis ColiClos injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Lawsonia ID vet. frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Lawsonia vet. frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis M Hyo ID vet injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV ID injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV M Hyo injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcivac Ery Parvo injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Poulvac E.coli frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Prascend, 1 mg tablett för häst Ej tillåtet för användning till hästar avsedda för humankonsumtion. Det måste intygas att hästen inte är avsedd för humankonsumtion i enlighet med nationell lagstiftning om hästpass. Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prasequin vet., 1 mg tablett för häst Ej tillåtet för användning till hästar avsedda för humankonsumtion. Det måste intygas att hästen inte är avsedd för humankonsumtion i enlighet med nationell lagstiftning om hästpass. Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVEXXION RN koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
PREVEXXION RN+HVT+IBD koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Procamidor Comp Vet, 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	0h	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Procamidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	0h	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Procapen vet, 3 g intramammär suspension för nötkreatur	Mjölk	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promased, 35 mg/ml oral gel för häst och hund. Använd ej till hästar vars kött, slaktbiprodukter och mjölk är avsedda för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pronestestic vet, 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	-	-	-	-	
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-	
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Pulmistin vet, 25 mikrogram/ml oral lösning för häst Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	
Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Rabisin vet. injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Receptal vet., 4,2 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Recocam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst										
Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Relmont vet, 1,38 g vaginalinlägg för nötkreatur										
Mjölken kan användas till humankonsumtion under behandlingen.	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
RenuTend injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Repose vet, 500 mg/ml injektionsvätska, lösning										
Tillräckliga åtgärder skall vidtas för att se till att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ReproCyc ParvoFLEX injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
RESPIPORC FLU3 injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
RESPIPORC FLUpan H1N1 injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
REXXOLIDE, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-
Rheumocam för hund och katt, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning hund och katt samt nötkreatur (kalvar och yngre nötkreatur) och svin	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Rheumocam för häst, 15 mg/ml oral suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Rheumocam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Rheumocam, 330 mg granulat i dospåse för häst	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
RHINISENG injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Ridamec Vet, 1 mg/ml oral lösning för får	Mjölk	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	
Rifen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt i.m.	3	4	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt i.v.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Rimadyl Bovis vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
Romefen vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-	
Rominervin vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
Rompun vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	9	42	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Spasmipur vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	12 <i>h</i>	-	12 <i>h</i>	-	12 <i>h</i>	-	-	-	-	-
	Slakt	2	9	18	-	3	-	-	-	-	-
Spasmiium vet., 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	96 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	(i.v)										
	Slakt	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	(i.m)										
	Slakt	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-
	(i.v)										
Spotinor vet, 10 mg/ml spot-on, lösning för nötkreatur och får	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej tillåtet för användning till fårhonor som producerar mjölk för humankonsumtion.											
	Slakt	17	-	35	-	-	-	-	-	-	-
STARTVAC injektionsvätska, emulsion för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellamune One vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Strangvac injektionsvätska, suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension											
Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.	Mjölk	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	60	60	60	-	-	-	-	-	-	
Suiseng Coli C vet injektionsvätska, suspension för svin											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Suiseng Diff/A injektionsvätska, suspension											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Suiseng vet. injektionsvätska, suspension för svin											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Suivac APP Vet. injektionsvätska, emulsion för svin											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Suvaxyn Aujeszky 783+O/W, pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Suvaxyn Circo injektionsvätska, emulsion											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Suvaxyn Circo+MH RTU injektionsvätska, suspension											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Suvaxyn CSF Marker frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Suvaxyn M. Hyo Mono injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PRRS MLV (125 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PRRS MLV (25 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PRRS MLV (50 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sympagesic, 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning Häst och nötkreatur: Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Använd inte till dräktiga djur som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.	Slakt	-	15	-	-	15	-	-	-	-
	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Syncroprost, 0,250 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar, svin och getter	Mjölk	0	-	-	0	0	-	-	-	-
	Slakt	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Synvet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Systamex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning											
Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syvazul BTV (serotyp 1) injektionsvätska, suspension											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
Syvazul BTV (serotyp 1+4) injektionsvätska, suspension											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
Syvazul BTV (serotyp 1+8) injektionsvätska, suspension											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
Syvazul BTV (serotyp 4) injektionsvätska, suspension											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
Syvazul BTV (serotyp 4+8) injektionsvätska, suspension											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
Syvazul BTV (serotyp 8) injektionsvätska, suspension											
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Taf vet., 28,5 mg/g kutan spray, lösning	Mjölk	0 <i>h</i>	-	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	0 <i>h</i>	-	-	-	-
	Använd inte på juver till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.									
	Slakt	0	14	0	0	0	-	-	-	0
Taneven vet, 3 g intramammär suspension för nötkreatur	Mjölk	120 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjölk	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	28	28	-	-	-	-	-	-
ThoroVAX vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Toltarox vet, 50 mg/ml oral suspension för svin	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-	-
Torbudine Vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hundar, katter och hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Torbugesic Vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Torphasol vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst										
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Toxicol vet. injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tranquigel vet, 35 mg/g oral gel för hund och häst Ej godkänt för användning till hästar avsedda för humankonsumtion.										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tranquinervin Vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för mänsklig konsumtion										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribovax vet. injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Trichoben vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Triclamox vet., 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning till får Mjölk: Ej godkänt för användning till tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive sinperioden. Använd inte till tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom ett år före första lamning.	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-	-
Trymox vet, 150 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur, får, svin, hund och katt Ej för användning till får som producerar mjölk för humankonsumtion	Mjölk	108 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	39	42	29	-	-	-	-	-	-
Tulaven, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-
Tulaven, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Tulinovet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-
Tulissin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-
Tulissin, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning											
	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	35	16	-	-	-	-	-	-	-	
Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.											
	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
Tyljet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötkreatur och svin											
	Mjölk	108 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	28	16	-	-	-	-	-	-	-	
Tylocure, 910 mg/g granulat för användning i dricksvatten											
	Slakt	-	24 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	
Tylucyl, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin											
	Mjölk	108 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	28	16	-	-	-	-	-	-	-	
UBAC injektionsvätska, emulsion											
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ubroseal vet, 2,6 g intramammär suspension för nötkreatur											
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension										
Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vectormune FP + ILT + AE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vectormune FP ILT frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vectormune ND för kyckling suspension och vätska till injektionsvätska, suspension										
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat										
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 25 mikrogram/ml oral lösning										
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
VEPURED injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Versiguard Rabies vet. injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
	Slakt	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:									
	Slakt	-	-	-	9	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
Vetbuton, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin, hästar, får och getter	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
	Slakt	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt									
	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Vetflurane, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska för hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar Produkten ska inte användas för behandling av ston som producerar mjölk för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Vetrimoxin vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och svin	Mjölk	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	18	20	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Xylavet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylexx Vet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, hästar, hundar och katter Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Mjölk	0 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning										
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylocain, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin										
	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Zitch Vet, 40 mg/ml pour-on, lösning Ej godkänt för användning hos hästar eller åsnor som är avsedda för humankonsumtion.										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Zorabel vet, 50 mg/ml oral suspension för svin										
	Slakt	-	73	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1+8 Bovis injektionsvätska, suspension										
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1+8 Ovis injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 8 Ovis injektionsvätska, suspension för får										
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zulvac BTV injektionsvätska, suspension										
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
ZULVAC SBV injektionsvätska, suspension										
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
ZUPREVO, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur										
Får ej ges till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
Får ej ges till dräktiga djur som är ämnade för produktion av mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad kalvning.	Slakt	47	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUPREVO, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin										
	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-